



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Государственное бюджетное учреждение
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»

ПРИНЯТО

на заседании Методического совета
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
Протокол от 25.12.2025 № 10

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
доктор медицинских наук, профессор

В.А. Мануковский



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ»

(срок обучения – 144 академических часа)

Санкт-Петербург, 2025 год

Организация-разработчик: Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе).

Составитель Программы:

Тулупов Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела сочетанной травмы ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе;

Вербицкий Владимир Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела неотложной хирургии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе;

Сердюк Валентин Иванович, заместитель главного врача по хирургии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе;

Мажара Юрий Павлович, старший преподаватель Учебного центра ГБУ СПб НИИ СПб им. И.И. Джанелидзе.

Программа соответствует требованиям, установленным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 мая 2026 г. № 569н «Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по специальности «Хирургия» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный № 87311 от 30 июня 2026 г.) и рекомендуется к реализации в образовательном процессе повышения квалификации специалистов с высшим медицинским образованием.

Программа обновлена 25 июня 2026г.

Рецензент:

Демко Андрей Евгеньевич, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 2-ой кафедрой и клиникой (хирургии усовершенствования врачей) Военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова

Руководитель Учебного центра
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе к.м.н.



В.Г. Валерко

№	СОДЕРЖАНИЕ	СТР
1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.....	6
3	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.....	14
4	УЧЕБНЫЙ ПЛАН.....	14
5	РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ.....	15
6	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.....	19
7	ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ.....	30
8	ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА.....	30
9	АННОТАЦИЯ.....	103

I. Общие положения

1. Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов¹ с высшим медицинским образованием (далее – Программа) является совершенствование компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности по специальности «Хирургия (область профессиональной деятельности² – 02 Здравоохранение, уровень квалификации³ – 8 уровень).
 2. В результате освоения образовательной программы ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (далее - Институт), обеспечивает совершенствование у обучающегося (слушателя) профессиональных компетенций (далее – ПК)⁴, включающих необходимые знания, умения, в соответствии с планируемыми результатами обучения и рабочими программами модулей.
 3. Форма обучения по Программе – очная, с возможностью частичного использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ).
 4. Трудоемкость обучения (срок освоения Программы): 144 академических часа.
 5. Программа реализуется в очной форме обучения на базе Института. К освоению Программы допускается следующий контингент: лица, завершившие обучение по программам интернатуры, ординатуры, профессиональной переподготовки, основная специальность – хирургия;
 6. Содержание Программы построено в соответствии с модульным принципом, структурными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля подразделяется на темы.
- Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские, практические занятия, формы контроля знаний и умений обучающихся).
- С учетом базовых знаний обучающихся и актуальности в Программу могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебным планом программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов.
7. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых отражаются требования профессиональных стандартов и квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям.
 8. Программа содержит требования к промежуточной и итоговой аттестациям обучающихся, осуществление которых проводится в виде тестирования, решения ситуационных задач, собеседования/зачета. Аттестации выявляют теоретическую и практическую подготовку в соответствии с целями и содержанием программы.

¹ Пункт 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2025 г. № 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2025 г., регистрационный № 81928), действует до 1 сентября 2031 года (далее – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам).

² Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

³ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534).

⁴ Пункт 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

9. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают:

- а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций;
- б) учебно-методическое и информационное обеспечение;
- в) материально-техническое обеспечение;
- г) кадровое обеспечение.

10. Связь Программы с профессиональными стандартами:

Наименование программы	Наименование выбранного профессионального стандарта	Уровень квалификации
«Избранные вопросы хирургии»	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 ноября 2018 г. № 743н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-хирург"	8

II. Планируемые результаты обучения

№ п/п	Коды и наименования совершенствуемых компетенций	Коды и наименования результатов обучения, соответствующих компетенциям	
		Знания (далее – з)	Умения (далее – у)
1	ПК-1. Способен при оказании медицинской помощи по профилю «хирургия» проводить медицинское обследование пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями с целью установления диагноза	1.31. Нормативные правовые акты, регламентирующие оказание медицинской помощи населению, включая порядок оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» в части диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий. 1.32. Клинические рекомендации при оказании медицинской помощи по профилю «хирургия» в части диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий. 1.33. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. 1.34. Этиология, патогенез, патоморфология, клиническая картина, дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий. 1.35. Клиническая симптоматика пограничных заболеваний в хирургии (урологических, акушерство-гинекологических, инфекционных). 1.36. Патофизиология травмы, кровопотери, раневого процесса, свертывающей системы крови. 1.37. Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями (их законных представителей). 1.38. Методика физикального обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 1.39. Методы диагностических (лабораторных, инструментальных) исследований у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 1.310. Медицинские показания к использованию диагностических (лабораторных, инструментальных) исследований у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, правила интерпретации их результатов.	1.y1. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями (их законных представителей). 1.y2. Интерпретация и анализ информации, полученной от пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями (их законных представителей). 1.y3. Оценка анатомо-функционального состояния органов и систем организма пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 1.y4. Выявление клинических симптомов и синдромов у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 1.y5. Физикальное обследование пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). 1.y6. Интерпретация и анализ результатов физикального обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 1.y7. Формулирование предварительного диагноза и составление плана диагностических (лабораторных, инструментальных) исследований у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 1.y8. Обоснование необходимости направления пациента с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями на диагностические (лабораторные, инструментальные) исследования. 1.y9. Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями на диагностические (лабораторные, инструментальные) исследования. 1.y10. Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями для оказания первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских показаний. 1.y11. Интерпретация и анализ результатов диагностических (инструментального и лабораторного) исследований пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 1.y12. Обоснование необходимости направления пациента с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями на консультацию к врачам-специалистам.

№ п/п	Коды и наименования совершенствуемых компетенций	Коды и наименования результатов обучения, соответствующих компетенциям	
		Знания (далее – з)	Умения (далее – у)
		1.311. Правила формулирования диагноза. 1.312. Хирургические заболевания и (или) состояния и их последствия, требующие оказания медицинской помощи в неотложной форме. 1.313. Медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями.	1.y13. Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями на консультацию к врачам-специалистам при наличии медицинских показаний. 1.y14. Интерпретация результатов медицинских осмотров врачами-специалистами пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 1.y15. Дифференциальная диагностика у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 1.y16. Установление, обоснование и формулирование диагноза пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 1.y17. Определение медицинских показаний для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями.
2	ПК-2. Способен при оказании медицинской помощи по профилю «хирургия» назначать и проводить лечение пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, контролировать его эффективность и безопасность	2.31. Нормативные правовые акты, регламентирующие оказание медицинской помощи населению, включая порядок оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» в части лечения пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.32. Клинические рекомендации при оказании медицинской помощи по профилю «хирургия» в части лечения пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.33. Методы лечения пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.34. Медицинские показания и противопоказания к проведению немедикаментозного лечения пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.35. Медицинские показания и медицинские противопоказания к назначению лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, немедикаментозного лечения у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.36. Медицинские показания и медицинские противопоказания к оперативному лечению пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.37. Принципы подготовки пациентов к операции и принципы ведения пациентов в послеоперационном периоде. 2.38. Медицинские изделия, применяемые для лечения	2.y1. Обоснование плана и тактики ведения пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.y2. Разработка плана лечения пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями с учетом диагноза, возраста и клинической картины. 2.y3. Определение медицинских показаний и противопоказаний к проведению лечения пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.y4. Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями с учетом клинической картины заболевания. 2.y5. Применение протоколов лекарственной терапии при лечении пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.y6. Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при хирургических заболеваниях и (или) состояниях и их последствиях. 2.y7. Назначение и проведение немедикаментозного лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.y8. Оценка эффективности и безопасности немедикаментозного лечения у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями. 2.y9. Определение медицинских показаний для направления пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями для оказания первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара. 2.y10. Разработка плана послеоперационного ведения пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями, проведение профилактики или лечения послеоперационных осложнений.

№ п/п	Коды и наименования совершенствуемых компетенций	Коды и наименования результатов обучения, соответствующих компетенциям	
		Знания (далее – з)	Умения (далее – у)
		пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.39. Медицинские показания для направления пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями для оказания первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара. 2.310. Принципы профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в результате лечебных манипуляций, оперативных вмешательств, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий. 2.311. Принципы организации и оказания скорой специализированной медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в составе отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи больницы, а также в составе выездной бригады, в том числе авиамедицинской бригады, для обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями во время медицинской эвакуации.	2.y11. Оценка результатов хирургических вмешательств и лечебных манипуляций у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 2.y12. Выявление послеоперационных осложнений и проведение их коррекции. 2.y13. Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в результате лечебных манипуляций, оперативных вмешательств, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий. 2.y14. Мониторинг пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями, корректировка плана лечения в зависимости от особенностей его течения. 2.y15. Оказание скорой специализированной медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в составе отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи больницы, а также в составе выездной бригады, в том числе авиамедицинской бригады, для обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями во время медицинской эвакуации.
3	ПК-3. Способен при оказании медицинской помощи по профилю «хирургия» оформлять направление на медицинскую реабилитацию пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями	3.31. Порядок организации медицинской реабилитации и порядок организации санаторно-курортного лечения. 3.32. Методы медицинской реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 3.33. Медицинские показания и противопоказания к проведению медицинской реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов.	3.y1. Определение медицинских показаний и противопоказаний для проведения мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 3.y2. Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий по медицинской реабилитации, том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 3.y3. Определение медицинских показаний и противопоказаний для направления пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями на санаторно-курортное лечение. 3.y4. Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями на санаторно-курортное лечение. 3.y5. Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской

№ п/п	Коды и наименования совершенствуемых компетенций	Коды и наименования результатов обучения, соответствующих компетенциям	
		Знания (далее – з)	Умения (далее – у)
			реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации.
4	ПК-4. Способен проводить медицинские экспертизы, медицинские осмотры, диспансеризацию, медицинское освидетельствование в отношении пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями	4.31. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядки проведения медицинских экспертиз, медицинского освидетельствования, медицинских осмотров (предварительных, периодических), диспансеризации, выдачи листка нетрудоспособности пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 4.32. Условия и порядок направления гражданина для решения вопроса о временной нетрудоспособности на экспертизу временной нетрудоспособности, проводимую врачебной комиссией медицинской организации. 4.33. Сроки временной нетрудоспособности. 4.34. Порядок организации медицинского освидетельствования, медицинских осмотров (предварительных, периодических), диспансеризации, диспансерного наблюдения с учетом возраста, состояния здоровья, профессии. 4.35. Медицинские показания для проведения диспансерного наблюдения за пациентами с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями. 4.36. Периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций). 4.37. Длительность диспансерного наблюдения за пациентами с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 4.38. Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинских осмотров, диспансеризации пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями.	4.y1. Определение признаков временной нетрудоспособности и признаков стойкого нарушения функций организма, обусловленных хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 4.y2. Направление пациентов для решения вопроса о временной нетрудоспособности на экспертизу временной нетрудоспособности, проводимую врачебной комиссией медицинской организации. 4.y3. Оформление листка нетрудоспособности. 4.y4. Определение медицинских показаний для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, для прохождения медико-социальной экспертизы. 4.y5. Оформление необходимой медицинской документации для пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, для осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы, в том числе в форме электронных документов. 4.y6. Оформление документов для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, на прохождение медико-социальной экспертизы. 4.y7. Направление пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, имеющих стойкое снижение трудоспособности, для прохождения медико-социальной экспертизы. 4.y8. Составление медицинских заключений по результатам медицинских экспертиз в части, касающейся наличия и (или) отсутствия хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствиями. 4.y9. Проведение медицинских осмотров с учетом возраста, состояния здоровья, профессии, пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 4.y10. Составление медицинских заключений по результатам медицинского освидетельствования, предварительных и периодических медицинских осмотров в части наличия и (или) отсутствия хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий. 4.y11. Осуществление диспансеризации населения с целью раннего выявления хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий. 4.y12. Формирование списков лиц, подлежащих диспансерному наблюдению в

№ п/п	Коды и наименования совершенствуемых компетенций	Коды и наименования результатов обучения, соответствующих компетенциям	
		Знания (далее – з)	Умения (далее – у)
			отчетном году, их поквартальное распределение. 4.y13. Информирование лиц, подлежащих диспансерному наблюдению в текущем году, или их законных представителей о необходимости явки в целях диспансерного наблюдения. 4.y14. Определение наличия медицинских показаний для проведения диспансерного наблюдения за пациентами с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 4.y15. Внесение сведений о диспансерном наблюдении за пациентом с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в его медицинскую документацию. 4.y16. Анализ результатов проведения диспансерного наблюдения на основании сведений, содержащихся в контрольных картах.
5	ПК-5. Способен при оказании медицинской помощи по профилю «хирургия» проводить мероприятия по профилактике хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий у населения	5.31. Основы здорового образа жизни, методы его формирования. 5.32. Методы контроля здорового образа жизни населения. 5.33. Мероприятия по профилактике хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий у населения. 5.34. Методы контроля за проведением мероприятий по профилактике хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий у населения. 5.35. Методы оценки эффективности проведения мероприятий по профилактике хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий у населения. 5.36. Формы и методы санитарно-просветительской работы среди пациентов (их законных представителей), медицинских работников по вопросам профилактики хирургических заболеваний и (или) состояний. 5.37. Формы и методы санитарно-просветительской работы по формированию элементов здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и борьбы с ним. 5.38. Нормативное правовое регулирование, подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 5.39. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 5.310. Меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов при выполнении медицинских вмешательств.	5.y1. Пропаганда здорового образа жизни у населения. 5.y2. Назначение мероприятий по профилактике хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий у населения, профилактика хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий. 5.y3. Обеспечение безопасности диагностических и лечебных манипуляций. 5.y4. Применение средств индивидуальной защиты. 5.y5. Участие в обеспечении мер асептики и антисептики, принципов индивидуальной изоляции при выполнении медицинских вмешательств. 5.y6. Безопасное обращение с острыми (колющими и режущими) инструментами, биологическими материалами.

№ п/п	Коды и наименования совершенствуемых компетенций	Коды и наименования результатов обучения, соответствующих компетенциям	
		Знания (далее – з)	Умения (далее – у)
		5.311. Требования асептики и антисептики при выполнении медицинских вмешательств.	
6	ПК-6. Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию, организовывать деятельность находящегося в распоряжении младшего и среднего медицинского персонала	6.31. Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «хирургия», в том числе в форме электронных документов. 6.32. Основы законодательства Российской Федерации о защите персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну. 6.33. Правила работы с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими врачебную тайну. 6.34. Должностные обязанности находящегося в распоряжении младшего и среднего медицинского персонала. 6.35. Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 6.36. Правила работы в информационных системах в сфере здравоохранения и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6.37. Требования пожарной безопасности, охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка. 6.38. Основы медицинской статистики.	6.y1. Составление плана работы и отчета о своей работе. 6.y2. Заполнение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа, контроль качества ее ведения. 6.y3. Использование в профессиональной деятельности медицинских информационных систем в сфере здравоохранения и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6.y4. Использование в профессиональной деятельности статистических методов изучения заболеваемости в хирургии. 6.y5. Анализ медико-статистических показателей медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями. 6.y6. Контроль за выполнением должностных обязанностей младшим и средним медицинским персоналом, находящимся в распоряжении. 6.y7. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требований пожарной безопасности, охраны труда. 6.y8. Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну. 6.y9. Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
7	ПК-7. Способен оказывать медицинскую помощь в экстренной форме	7.31. Принципы и методы оказания медицинской помощи в экстренной форме в соответствии с нормативными правовыми актами и клиническими рекомендациями. 7.32. Клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 7.33. Факторы риска, представляющие непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц, методы устранения указанных факторов риска. 7.34. Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента (пострадавшего) при оказании медицинской помощи в экстренной форме при отсутствии сознания; остановке дыхания и (или) остановке кровообращения; нарушении проходимости дыхательных путей инородным телом и иных угрожающие жизни и здоровью нарушения дыхания; наружных кровотечениях; травмах, ранениях и поражениях, вызванных механическими, химическими,	7.y1. Диагностика состояний, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 7.y2. Определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц. 7.y3. Устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания медицинской помощи в экстренной форме и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших). 7.y4. Обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты. 7.y5. Вызов выездной бригады скорой медицинской помощи, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи. 7.y6. Оценка количества пострадавших. 7.y7. Устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности

№ п/п	Коды и наименования совершенствуемых компетенций	Коды и наименования результатов обучения, соответствующих компетенциям	
		Знания (далее – з)	Умения (далее – у)
		электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения; отравлениях; укусах или ужаления ядовитых животных; судорожном приступе, сопровождающемся потерей сознания; острых психологических реакциях на стресс. 7.35. Правила эффективной коммуникации с пациентами, их законными представителями, окружающими лицами и медицинскими работниками при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 7.36. Алгоритм обращения в службы спасения, в том числе вызова выездной бригады скорой медицинской помощи. 7.37. Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции). 7.38. Правила выполнения наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции) с использованием автоматического наружного дефибриллятора. 7.39. Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению реанимационных мероприятий. 7.310. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 7.311. Методы обеспечения проходимости дыхательных путей. 7.312. Правила остановки наружных кровотечений. 7.313. Правила наложения повязок при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 7.314. Способы охлаждения при травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужалениях ядовитых животных; проведения термоизоляции и согревания при воздействии низких температур. 7.315. Методы иммобилизации с использованием медицинских изделий и подручных средств. 7.316. Правила использования средств индивидуальной защиты при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 7.317. Правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при оказании медицинской помощи в экстренной форме, порядок передачи пациента выездной бригаде скорой медицинской помощи.	оказывать медицинскую помощь в экстренной форме, а также о начале проведения мероприятий по оказанию медицинской помощи в экстренной форме. 7.y8. Осуществление эффективной коммуникации с пациентом, его законным представителем, окружающими лицами и медицинскими работниками, в том числе выездной бригадой скорой помощи при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 7.y9. Устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего. 7.y10. Извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест. 7.y11. Перемещение пострадавшего в безопасное место. 7.y12. Обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом. 7.y13. Проведение первичного осмотра пациента при состояниях, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 7.y14. Осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения, в том числе прямым давлением на рану, наложением давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела), наложением кровоостанавливающего жгута. 7.y15. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего (наличие сознания, наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания). 7.y16. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 7.y17. Использование автоматического наружного дефибриллятора. 7.y18. Наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки. 7.y19. Промывание желудка. 7.y20. Охлаждение при травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужалениях ядовитых животных. 7.y21. Проведение термоизоляции и согревания при воздействии низких температур. 7.y22. Проведение иммобилизации (обездвиживания) с использованием медицинских изделий или подручных средств; аутоиммобилизация или обездвиживание руками травмированных частей тела. 7.y23. Предотвращение дополнительного травмирования головы при судорожном приступе, сопровождающемся потерей сознания. 7.y24. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего в зависимости от его состояния. 7.y25. Осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание

№ п/п	Коды и наименования совершенствуемых компетенций	Коды и наименования результатов обучения, соответствующих компетенциям	
		Знания (далее – з)	Умения (далее – у)
		7.з18. Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме.	пострадавшему психологической поддержки. 7.у26. Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме.

III. Календарный учебный график

Наименование модулей	Трудоемкость освоения (акад. час.)			
	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
Модуль 1. Актуальные вопросы медицинского обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний	28			
Модуль 2. Актуальные вопросы хирургического лечения и медицинской реабилитации	8	36	6	
Модуль 3. Актуальные вопросы организации работы врача-хирурга. Медицинская экспертиза в хирургии			30	2
Модуль 4. Современные технологии оказания медицинской помощи в экстренной форме				6
Модуль 5. Практика				24
Итоговая аттестация				4
Общая трудоемкость программы (час)				144

IV. Учебный план⁵

№ п/п	Наименования модулей, тем, разделов практики	Количество часов (трудоемкость)						
		всего	в том числе по видам учебной деятельности					
			лекции	занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)			практика	аттестация
				практическая подготовка	возможно использование ЭО и ДОТ			
1	Модуль 1. Актуальные вопросы медицинского обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний	28	2	26	10	0	0	0
1.1	Актуальные вопросы организации медицинской помощи по профилю «хирургия»	8	1	7	2	0	0	0
1.2	Актуальные вопросы клинического обследования пациента, диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний, ранений и травм, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме	20	1	19	8	0	0	0
2	Модуль 2. Актуальные вопросы хирургического лечения и медицинской реабилитации	50	0	49	21	0	0	1
2.1	Планирование и обоснование хирургического лечения	8	0	8	4	0	0	0
2.2	Хирургические вмешательства и манипуляции при хирургических заболеваниях, ранениях и травмах, требующих оказания медицинской помощи в	19	0	19	9	0	0	0

⁵ Пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); пункт 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

¹¹ Часть 4 статьи 82 Федерального закона № 273-ФЗ.

№ п/п	Наименования модулей, тем, разделов практики	Количество часов (трудоемкость)							
		всего	в том числе по видам учебной деятельности						
			лекции	занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)				практика	аттестация
				всего	в том числе				
					практическая подготовка	возможно использование ЭО и ДОТ			
	экстренной форме								
2.3	Послеоперационное ведение пациента	10	0	10	4	0	0	0	
2.4	Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение пациентов хирургического профиля	6	0	6	2	0	0	0	
2.5	Профилактика хирургических заболеваний	6	0	6	2	0	0	0	
2.6	Промежуточная аттестация по модулю 2	1	0	0	0	0	0	1	
3	Модуль 3. Актуальные вопросы организации работы врача-хирурга. Медицинская экспертиза в хирургии	32	0	32	16	0	0	0	
3.1	Медицинская документация и информационные технологии	10	0	10	6	0	0	0	
3.2	Организационно-управленческая деятельность врача-хирурга	12	0	12	6	0	0	0	
3.3	Медицинские экспертизы, осмотры и диспансерное наблюдение в практике врача-хирурга	10	0	10	4	0	0	0	
4	Модуль 4. Современные технологии оказания медицинской помощи в экстренной форме	6	2	4	0	0	0	0	
4.1	Оказание медицинской помощи в экстренной форме	6	2	4	0	0	0	0	
5	Модуль 5. Практика	24	0	0	0	0	24	0	
5.1	Оказание медицинской помощи по профилю «хирургия» в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара	12	0	0	0	0	12	0	
5.2	Оказание медицинской помощи по профилю «хирургия» в стационарных условиях	12	0	0	0	0	12	0	
6	Итоговая аттестация	4	0	0	0	0	0	4	
Итого часов (трудоемкость)		144	4	111	47	0	24	5	

V. Рабочие программы модулей⁶

№ п/п	Наименование модулей, тем, разделов практики	Содержание	Коды формируемых компетенций
1	Модуль 1. Актуальные вопросы медицинского обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний		
1.1	Актуальные вопросы организации медицинской помощи по профилю «хирургия»	Действующие нормативные правовые акты, регулирующие охрану здоровья и оказание медицинской помощи по профилю «хирургия». Актуальные порядки, стандарты и клинические рекомендации по профилю «хирургия». Организация и документирование деятельности медицинской организации. Современные принципы организации первичной медико-санитарной, скорой, неотложной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями. Маршрутизация пациентов с хирургической патологией. Актуальные вопросы организации работы кабинета врача-хирурга поликлиники, взаимодействие между звеньями медицинской помощи. Современные алгоритмы отбора пациентов, медицинские	ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6

⁶ Пункт 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

№ п/п	Наименование модулей, тем, разделов практики	Содержание	Коды формируемых компетенций
		показания к оказанию медицинской помощи в условиях стационара. Тактика выездных бригад скорой медицинской помощи, критерии транспортировки. Актуальные вопросы организации работы хирургического стационара: устройство отделений, современные технологии, планирование хирургических вмешательств.	
1.2	Актуальные вопросы клинического обследования пациента, диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний, ранений и травм, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме	Клинические проявления пограничных заболеваний в хирургии. Состояния, требующие оказания хирургической помощи в экстренной форме. Клиническая диагностика хирургических болезней с позиции доказательной медицины. Симптомы острых и хронических хирургических заболеваний, ранений и травм, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. Актуальные вопросы организации обследования пациента, подготовка врача и рабочего места. Современные методы лабораторных и инструментальных исследований в хирургии. Дифференциальная диагностика хирургических болезней. Современная редакция Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Современные принципы и алгоритмы построения клинического диагноза хирургических заболеваний, ранений и травм, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. Актуальный порядок проведения медицинской сортировки раненых и пострадавших.	ПК-1
2	Модуль 2. Актуальные вопросы хирургического лечения и медицинской реабилитации		
2.1	Планирование и обоснование хирургического лечения	Современные подходы к разработке комплексного плана лечения. Современные принципы доказательной медицины при назначении и обосновании схем применения лекарственных препаратов. Назначение немедикаментозных методов лечения. Организация мониторинга, оценка эффективности и безопасности проводимой терапии. Коммуникация с пациентом и психологические аспекты принятия решений. Составление индивидуального плана подготовки пациента к оперативному вмешательству (плановому и экстренному). Оценка рисков осложнений и прогнозирование исходов лечения. Психологическая поддержка пациента. Современные принципы, стратегии и алгоритмы принятия решений в хирургии с учетом рисков, прогноза и альтернативных подходов. Современные виды и принципы хирургических вмешательств. Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний к операции, анализ факторов, влияющих на выбор ее объема и метода, включая мультидисциплинарный подход и миниинвазивные технологии. Актуальные вопросы организации дооперационного периода: обследование, подготовка пациента и анестезиологическое обеспечение. Безопасность хирургической деятельности, основные оперативные приемы. Практические аспекты выбора метода операции и разработки плана подготовки пациента. Оценка состояния, прогнозирование рисков и тактика ведения пациентов «высокого риска». Актуальные вопросы организации работы операционной бригады. Современные оперативные техники, этапы операции. Оформление протокола операции. Анализ результатов хирургического лечения и оценка качества жизни пациентов	ПК-2
2.2	Хирургические вмешательства и манипуляции при хирургических заболеваниях, ранениях и травмах, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме	Актуальные правила и порядок подготовки пациентов к медицинским манипуляциям и оперативным вмешательствам. Правила выполнения медицинских манипуляций и оперативных вмешательств. Современные методы инструментального исследования при оказании медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями, ранениями и травмами, требующими оказания медицинской помощи в экстренной форме и их последствиями: аноскопия; биопсия кожи; биопсия лимфатического узла; биопсия мышц; лапароцентез; лапароскопия диагностическая; лапаротомия диагностическая; пункция	ПК-2

№ п/п	Наименование модулей, тем, разделов практики	Содержание	Коды формируемых компетенций
		перикарда; торакоцентез - медицинские показания, медицинские противопоказания, подготовка, техника выполнения, осложнения. Современные медицинские манипуляции при оказании медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями, ранениями и травмами, требующими оказания медицинской помощи в экстренной форме и их последствиями: внутрисуставное введение лекарственных препаратов; вправление вывиха суставов; вправление парафимоза; катетеризация мочевого пузыря; наложение гипсовой повязки при переломах костей; наложение иммобилизационной повязки при переломах костей; наложение окклюзионной повязки на грудную клетку при открытом пневмотораксе; передняя и задняя тампонада носа; репозиция отломков костей при переломах; установка назогастрального зонда; установка подкожного катетера; пункция и (или) дренирование гнойного очага, в том числе под контролем ультразвукового исследования; пункция и (или) дренирование плевральной полости при напряженном пневмотораксе, в том числе под контролем ультразвукового исследования; пункция синовиальной сумки сустава; пункция мягких тканей, в том числе под контролем ультразвукового исследования; пункция и аспирация и (или) дренирование кист брюшинного пространства, в том числе под контролем ультразвукового исследования; наложение скелетного вытяжения при переломах конечностей; удаление инородного тела прямой кишки без разреза - медицинские показания, медицинские противопоказания, подготовка, техника выполнения, осложнения.	
2.3	Послеоперационное ведение пациента	Актуальные вопросы организации лечения, ухода и активного ведения больного. Назначение лекарственной терапии, диетотерапии и применение медицинских изделий в процессе восстановления. Профилактика, ранняя диагностика и лечение возможных осложнений, в том числе тромбоэмболических. Хирургическая инфекция области хирургического вмешательства, пролежни, ятрогения. Современные схемы послеоперационного ведения пациентов. Современные методики подбора лекарственной терапии: обезболивание, антибиотикотерапия, иммунная поддержка. Актуальные вопросы организации питания для улучшения регенерации. Контроль состояния послеоперационной раны, дренажей, катетеров. Мониторинг эффективности и безопасности терапии. Диагностика и профилактика ранних и поздних, местных и общих осложнений с использованием шкал прогнозирования рисков. Актуальные алгоритмы диагностики и лечения хирургической инфекции.	ПК-2
2.4	Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение пациентов хирургического профиля	Современное клинко-физиологическое обоснование применения средств медицинской реабилитации хирургических пациентов: лечебная физкультура (кинезиотерапия), физиотерапия, методы психосоциальной поддержки. Современные подходы к разработке индивидуальной программы медицинской реабилитации для пациента хирургического профиля: оценка функциональных нарушений, определение реабилитационного потенциала. Современные методы ранней послеоперационной активизации, мобилизации и эрготерапии. Абилизация и реабилитация пациентов с последствиями ампутаций, стом, контрактур, неврологических нарушений: подбор и обучение пользованию техническими средствами реабилитации (протезы, ортезы, ходунки). Актуальные вопросы организации санаторно-курортного лечения: медицинские показания и медицинские противопоказания к направлению на санаторно-курортное лечение, критерии отбора пациентов, природные и преформированные лечебные факторы (бальнеотерапия, пелоидотерапия, климатотерапия) в комплексной реабилитации хирургических пациентов.	ПК-3
2.5	Профилактика	Современные стратегии профилактической работы в хирургии.	ПК-4, ПК-5

№ п/п	Наименование модулей, тем, разделов практики	Содержание	Коды формируемых компетенций
	хирургических заболеваний	Актуальные вопросы организации профилактической работы в хирургической практике. Современные принципы и методы первичной, вторичной и третичной профилактики хирургических заболеваний. Коррекция факторов риска. Современные принципы здорового образа жизни, его компоненты, актуальные психологические и социальные аспекты. Асептика и антисептика как основа хирургической профилактики. Проведение индивидуального и группового консультирования, в том числе в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Работа с группами риска, профилактика зависимостей. Мониторинг и оценка эффективности профилактических мероприятий.	
2.6	Промежуточная аттестация по модулю 2	Контроль результатов обучения в рамках освоения тем 2.1-2.5.	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
3	Модуль 3. Актуальные вопросы организации работы врача-хирурга. Медицинская экспертиза в хирургии		
3.1	Медицинская документация и информационные технологии	Современное нормативно-правовое регулирование ведения медицинской документации в стационарных и амбулаторных условиях. Виды и унифицированные формы документов. Электронный документооборот, использование медицинской карты в форме электронного документа и электронной подписи. Современные информационные технологии в здравоохранении: медицинские информационные системы, их цели, задачи и правовое регулирование. Современные организационно-правовые аспекты, принципы хранения и защиты информации. Автоматизированное рабочее место врача-хирурга, ведение электронной медицинской карты и статистической отчетности. Юридическая ответственность, правовые аспекты защиты персональных данных, врачебной тайны и этических норм при работе с медицинской информацией.	ПК-6
3.2	Организационно-управленческая деятельность врача-хирурга	Актуальные вопросы организации, контроля и управления деятельностью подчиненных медицинских работников в рамках работы хирургического отделения медицинской организации. Должностные обязанности врача-хирурга. Современные принципы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, ведение медицинской документации. Обеспечение безопасности труда, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, профилактика профессиональных рисков. Организация обучения, наставничества и оценки профессионального роста. Современные экономические аспекты управления ресурсами в хирургическом отделении медицинской организации.	ПК-6, ПК-4
3.3	Медицинские экспертизы, осмотры и диспансерное наблюдение в практике врача-хирурга	Актуальная нормативно-правовая база проведения медицинских экспертиз, освидетельствований, предварительных и периодических медицинских осмотров, диспансеризации, формирования и выдачи листов нетрудоспособности. Современная методология организации и проведения медицинских экспертиз и осмотров в медицинских организациях. Актуальные вопросы организации работы по диспансерному наблюдению пациентов с хирургическими заболеваниями в соответствии с возрастными и профессиональными критериями. Критерии эффективности диспансерного наблюдения. Определение групп здоровья, диспансерного наблюдения. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Взаимодействие с бюро медико-социальной экспертизы при оформлении инвалидности.	ПК-4
4	Модуль 4. Современные технологии оказания медицинской помощи в экстренной форме		
4.1	Оказание медицинской помощи в экстренной форме	Современное нормативно-правовое регулирование оказания медицинской помощи в экстренной форме. Диагностика состояний, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. Коммуникация со службами спасения, выездными бригадами скорой медицинской помощи, пациентом, его законным	ПК-7

№ п/п	Наименование модулей, тем, разделов практики	Содержание	Коды формируемых компетенций
		представителем и окружающими лицами. Транспортировка и иммобилизация пациента. Сердечно-легочная реанимация. Остановка наружных кровотечений. Обеспечение проходимости дыхательных путей. Промывание желудка. Применение согревания и охлаждения. Проведение термоизоляции и согревания при воздействии низких температур. Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий.	
5	Модуль 5. Практика		
5.1	Оказание медицинской помощи по профилю «хирургия» в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара	Участие в оказании медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара: проведении медицинского обследования; назначении и проведении лечения и контроле его эффективности и безопасности; проведении медицинской реабилитации и контроле ее эффективности; проведении мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни; проведении медицинских осмотров и диспансеризации; проведении экспертизы временной нетрудоспособности; ведении медицинской документации; организации деятельности находящегося в распоряжении среднего и младшего медицинского персонала.	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
5.2	Оказание медицинской помощи по профилю «хирургия» в стационарных условиях	Участие в оказании медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями, ранениями и травмами, требующими оказания медицинской помощи в экстренной форме в стационарных условиях: проведении медицинского обследования; назначении и проведении лечения и контроле его эффективности и безопасности; проведении медицинской реабилитации и контроле ее эффективности; проведении экспертизы временной нетрудоспособности; ведении медицинской документации; организации деятельности находящегося в распоряжении среднего и младшего медицинского персонала.	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6

VI. Организационно-педагогические условия реализации Программы⁷

6.1 Тематика учебных занятий

Тематика учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций:
лекционные занятия

№	Тема лекции	Содержание	Технология проведения (очно, дистанционно)	Совершенствуемые компетенции
	Актуальные вопросы организации медицинской помощи по профилю «хирургия»	1.1	очно	ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6
	Актуальные вопросы клинического обследования пациента, диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний, ранений и травм, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме	1.2	очно	ПК-1
	Оказание медицинской помощи в экстренной форме	4.1	очно	ПК-7

Тематика учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций:
семинарские занятия

⁷ Пункт 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

№	Тема семинарского занятия	Содержание	Технология проведения (очно, дистанционно)	Совершенствуемые компетенции
	Актуальные вопросы организации медицинской помощи по профилю «хирургия»	1.1	очно	ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6
	Актуальные вопросы клинического обследования пациента, диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний, ранений и травм, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме	1.2	очно	ПК-1
	Планирование и обоснование хирургического лечения	2.1	очно	ПК-2
	Хирургические вмешательства и манипуляции при хирургических заболеваниях, ранениях и травмах, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме	2.2	очно	ПК-2
	Послеоперационное ведение пациента	2.3	очно	ПК-2
	Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение пациентов хирургического профиля	2.4	очно	ПК-3
	Профилактика хирургических заболеваний	2.5	очно	ПК-4, ПК-5
	Медицинская документация и информационные технологии	3.1	очно	ПК-6
	Организационно-управленческая деятельность врача-хирурга	3.2	очно	ПК-4, ПК-6
	Медицинские экспертизы, осмотры и диспансерное наблюдение в практике врача-хирурга	3.3	очно	ПК-4
	Оказание медицинской помощи в экстренной форме	4.1	очно	ПК-7

Тематика учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций:
практические занятия

№	Тема практического занятия	Содержание	Технология проведения (очно, дистанционно)	Совершенствуемые компетенции
	Актуальные вопросы организации медицинской помощи по профилю «хирургия»	1.1	очно	ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6
	Актуальные вопросы клинического обследования пациента, диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний, ранений и травм, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме	1.2	очно	ПК-1
	Планирование и обоснование хирургического лечения	2.1	очно	ПК-2
	Хирургические вмешательства и манипуляции при хирургических заболеваниях, ранениях и травмах, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме	2.2	очно	ПК-2
	Послеоперационное ведение пациента	2.3	очно	ПК-2
	Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение пациентов хирургического профиля	2.4	очно	ПК-3
	Профилактика хирургических заболеваний	2.5	очно	ПК-4, ПК-5

№	Тема практического занятия	Содержание	Технология проведения (очно, дистанционно)	Совершенствуемые компетенции
	Медицинская документация и информационные технологии	3.1	очно	ПК-6
	Организационно-управленческая деятельность врача-хирурга	3.2	очно	ПК-4, ПК-6
	Медицинские экспертизы, осмотры и диспансерное наблюдение в практике врача-хирурга	3.3	очно	ПК-4
	Оказание медицинской помощи в экстренной форме	4.1	очно	ПК-7
	Оказание медицинской помощи по профилю «хирургия» в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара	5.1	очно	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
	Оказание медицинской помощи по профилю «хирургия» в стационарных условиях	5.2	очно	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6

Обучающий симуляционный курс (практика Модуль 4):

№	Тема занятия	Содержание	Используемые тренажеры	Совершенствуемые компетенции
1.	Базовая сердечно-легочная реанимация: закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция легких. Первая помощь.	Автоматическая наружная дефибрилляция. Безопасная работа с дефибриллятором.	Компьютеризированный торт для сердечно-легочная реанимации. Дефибриллятор, электрокардиограф, торт для ЭКГ и дефибрилляции, анатомические муляжи, иллюстративный материал по теме занятия.	ПК-7
2.	Обеспечение проходимости дыхательных путей.	Поворот в восстановительное боковое положение, прием Геймлиха, постановка назо- и орофарингеального воздуховода, надгортанных воздуховодов.	Тренажер для интубации трахеи, Тренажеры для выполнения приема Геймлиха, анатомические муляжи, иллюстративный материал по темам занятий.	ПК-7
3.	Остановка наружных кровотечений.	Остановка наружного кровотечения путем наложения давящей повязки	Тренажер-имитатор для обучения остановке наружного кровотечения травмированных конечностей. анатомические муляжи, иллюстративный материал по темам занятий.	ПК-7
4.	Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий.	Подкожные инъекции. Внутримышечные инъекции. Внутривенные инъекции; постановка периферического венозного катетера. Катетеризация мочевого пузыря.	Тренажеры для отработки навыков подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций, лекарственные средства (имитация). Манекен для катетеризации мочевого пузыря женщины и мужчины, анатомические муляжи, иллюстративный материал по темам занятия.	ПК-7
5.	Промывание желудка.	Зондовое промывание желудка при остром пероральном отравлении.	Тренажер для промывания желудка, иллюстративный материал по темам занятий	ПК-7

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Института. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Института, так и вне его.

Рекомендованный список литературы: Основная литература

1	Абдоминальная хирургия: национальное руководство / под ред. Акад. РАН И.И. Затевахиной, акад. РАН А.И. Кириенко, чл.-корр. РАН А.В. Сажина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 912 с.
2	Багненко С. Ф. Скорая медицинская помощь: национальное руководство / под ред. С. Ф. Багненко, М. Ш. Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллиной. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 888 с.
3	Бояринцев, В. В. Хирургический больной : мультидисциплинарный подход / под ред. Бояринцева В. В. , Пасечника И. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 336 с.
4	Бунятян А.А. Анестезиология: национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 656 с.
5	Буриев, И. М. Острый калькулезный холецистит и его осложнения. Новое о холелитиазе. Практическое руководство / под ред. И. М. Буриева, Г. Г. Мелконяна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 272 с.
6	Военно-полевая хирургия. Национальное руководство. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. И.М. Самохвалова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. – 1056 с.
7	Геккиева А. Д. Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы реаниматологии: учебное пособие / А. Д. Геккиева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 128 с.
8	Гостищев В. К. Клиническая оперативная гнойная хирургия: руководство для врачей/ В. К. Гостищев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с.
9	Джонас, Р. А. Дополнительные материалы к изданию : "Хирургическое лечение врожденных пороков сердца" / Ричард А. Джонас ; пер. с англ. под ред. М. В. Борискова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 736 с.
10	Дыдыкин, С. С. Современные хирургические инструменты : справочник / С. С. Дыдыкин, Е. В. Блинова, А. Н. Щербюк - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с.
11	Евсеев, М. А. Уход за больными в хирургической клинике / Евсеев М. А - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с.
12	Жиборев, Б. Н. Мужское бесплодие и хирургические заболевания органов половой системы / Жиборев Б. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 304 с.
13	Загрядский, Е. А. Малоинвазивная хирургия геморроидальной болезни / Е. А. Загрядский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 224 с.
14	Затевахин, И. И. Абдоминальная хирургия. Национальное руководство : краткое издание / под ред. И. И. Затевахиной, А. И. Кириенко, В. А. Кубышкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 912 с. : ил. - (Серия "Национальные руководства"). - 912 с.
15	Затевахин, И. И. Программа ускоренного выздоровления хирургических больных. Fast track / под ред. И. И. Затевахиной, К. В. Лядова, И. Н. Пасечника. -

	Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 208 с. : ил. - (Серия "Библиотека врача-специалиста")
16	Калинин Р. Е. Клапанная недостаточность при варикозной болезни вен нижних конечностей / Калинин Р. Е. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 112 с.
17	Калинин Р. Е. Клиническая анатомия системы воротной вены печени / Р. Е. Калинин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с.
18	Калинин Р. Е. Система гемостаза и эндотелиальная дисфункция при артериальных реконструкциях / Р. Е. Калинин, И. А. Сучков, Н. Д. Мжаванадзе, Э. А. Климентова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 128 с
19	Каприн А. Д. Мастопатии / под ред. Каприна А. Д. , Рожковой Н. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 320 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста")
20	Каприна, А. Д. Маммология / под ред. А. Д. Каприна, Н. И. Рожковой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. (Серия "Национальные руководства")
21	Кек Т. Минимальноинвазивная абдоминальная хирургия / Т. Кек, К. Гермер, А. Шабунин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с
22	Клинические рекомендации. Колопроктология / под ред. Ю. А. Шелыгина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 560 с.
23	Кузнецов, Н. А. Прогнозирование в плановой хирургии / Н. А. Кузнецов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 336 с.
24	Кулезнева Ю. М. Чрескожные вмешательства в абдоминальной хирургии / Кулезнева Ю. М. , Израилов Р. Е. , Мусаев Г. Х. , Кириллова М. С. , Мороз О. В. , Мелехина О. В. , под ред. Ю. В. Кулезневой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с.
25	Куликов, Е. П. Результаты и качество жизни больных после пилоросохранной резекции желудка при раке / Куликов Е. П. , Мерцалов С. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 144 с.
26	Маев И. В. Болезни пищевода / Маев И. В. , Бусарова Г. А. , Андреев Д. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 648 с.
27	Неотложная абдоминальная хирургия: Методическое руководство для практикующего врача / под ред. Акад. РАН И.И. Затевахиной, акад. РАН А.И. Кириенко, чл.-корр. РАН А.В. Сажина. – Москва: ООО «Медицинское информационное агентство», 2018. – 488 с.
28	Олейников П. Н. Руководство по амбулаторной хирургической помощи / под ред. П. Н. Олейникова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 416 с.
29	Организация и содержание медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие /под ред. профессора И.П. Миннуллиной/ СПб.: РИЦ ПСПбГМУ.2019.-124 с.
30	Палевская С. А. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / С. А. Палевская, А. Г. Короткевич. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 752 с.
31	Паршин В. Д. Хирургия грудного протока / В. Д. Паршин, Т. Н. Седова, А. Я. Самохин. - 2-е изд. , доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 200 с.
32	Первая помощь и медицинские знания: практическое руководство по действиям в неотложных ситуациях/под ред. Л.И.Дежурного, И.П. Миннуллиной.- Москва: ГЭОТАР-Медиа,2019.-256 с.
33	Программа ускоренного выздоровления хирургических больных. Fast track / под ред. И. И. Затевахиной, К. В. Лядова, И. Н. Пасечника. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 208 с.
34	Ревивили А. Ш. Криохирugia / под ред. А. Ш. Ревивили, А. В. Чжао, Д. А. Ионкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 376 с.
35	Решетов И. В. Рак щитовидной железы : руководство для врачей / Решетов И. В. ,

	Романчишен А. Ф. , Гостимский А. В. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 128 с. (Серия "Онкология")
36	Ривкин В. Л. Болезни прямой кишки / Ривкин В. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста")
37	Родоман Г. Е. Общая хирургия : основные клинические синдромы / Г. Е. Родоман, Т. И. Шалаева, И. Р. Сумеди, Т. Е. Семенова, Е. К. Наумов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с.
38	Савельев В. С. Сосудистая хирургия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 464 с.
39	Черепанин, А. И. Острый холецистит / Черепанин А. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с.
40	Черных А. В. Грыжи живота : иллюстрированное руководство / А. В. Черных, В. В. Алипов, М. П. Попова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с.
41	Эндогенная интоксикация в неотложной абдоминальной хирургии. Новые подходы к коррекции / А. П. Власов, Н. Ю. Лещанкина, Т. И. Власова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 320 с.

Дополнительная литература

1. Дворецкий С. Ю., Акопов А. Л., Тулупов А.Н. и др. Практическое руководство по торакальной хирургии. - М.: ГЭОТАР-Медиа.- 2026. – 752 с. DOI: 10.33029/9704-9176-8-PGT-2026-1-752. ISBN: 978-5-9704-9176-8
2. Зиновьев Е.В., Юрова Ю.В., Крылов К.М. и др. Травматическая отслойка кожи: диагностика, лечение: пособие для врачей. - СПб./ СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. - 2023. — 36 с.
3. Инфекции в хирургии. Диагностика, лечение, профилактика. Практическое руководство / под ред. С. Бартоли, Ф. Кортеше, М. Сартелли, Г. Сганга ; пер. с англ. под ред. А. Н. Тулупова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2026. — 192 с. : ил. — DOI: 10.33029/9704-9557-5-IIS-2026-1-192. Тулупов А.Н. – научный редактор перевода.
4. Крюков Е.В., Багненко А.С., Бадалов В.И., Бельских А.Н., Кажанов И.В. [и др.] Военно-полевая хирургия: учебное пособие для студентов медицинских высших учебных заведений и врачей хирургических профилей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 568 с.
5. Мануковский В. А., Тулупов А. Н. [и др.] Огнестрельные ранения груди, живота, таза и позвоночника : руководство для врачей — 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. — 288 с. - — DOI: 10.33029/9704-9262-8-CPS-2025-1-288.
6. Мануковский В.А., Тулупов А.Н., Демко А.Е. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению политравмы. - Учебно-методическое пособие. - СПб.: СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.- 2021. – 88 с.
7. Мануковский В.А., Тулупов А.Н., Демко А.Е. и др. Повреждения живота: учебно-методическое пособие. -СПб. / СПбНИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, 2023. - 104 с.
8. Скорая медицинская помощь: национальное руководство / под ред. С.Ф. Багненко, С.С. Петрикова, И.П. Миннуллина, А.Г. Мирошниченко – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2025. – 1032 с.
9. Тулупов А. Н., Мануковский В. А., Демко А. Е. [и др.] Неотложная хирургия груди и живота : руководство для врачей. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. — 752 с. — DOI:10.33029/9704-7848-6-SUR-2024-1-752.
10. Тулупов А. Н., Мануковский В.А. Закрытые повреждения живота: руководство для

врачей. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 232 с. — DOI: 10.33029/9704-6186-0-CIA-2021-1-232.

11. Тулупов А. Н., Мануковский В.А. Политравма: руководство для врачей. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 960 с. : ил. — DOI: 10.33029/9704-6527-1-РТО2022-1-960. ISBN 978-5-9704-6527-1

12. Тулупов А. Н., Мануковский В.А., Демко А.Е., и др. Видеоторакоскопия при повреждениях груди. - Учебно-методическое пособие. - СПб.: СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. - 2021. — 24 с.

13. Тулупов А.Н., Демко А.Е., Савелло В.Е. и др. Острый абсцесс и гангрена легкого: учебное пособие. - СПб./ СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. - 2024. — 54 с.

14. Тулупов А.Н., Демко А.Е., Савелло В.Е. и др. Эмпиема плевры и пиопневмоторакс: Учебно-методическое пособие. СПб.: СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 2025. — 48 с

15. Тулупов А.Н., Мануковский В.А., Демко А.Е. и др. Торакоабдоминальная травма: учебно-методическое пособие. - СПб./ СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. - 2024. — 96 с.

16. Тулупов А.Н., Мануковский В.А., Демко А.Е. и др. Повреждения груди: Учебно-методическое пособие. СПб.: Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. - 2025. - 120 с.

17. Хирургия неотложных состояний / под ред. Л. Д. Бритта, Э. Б. Пейтцмана, Ф. С. Бэри, Г. Дж. Джурковича ; пер. с англ. под ред. С. С. Петрикова, В. А. Мануковского, М. Л. Рогая, П. А. Ярцева, А. Н. Тулупова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 1072 с. : ил. — («Золотая серия»). — DOI: 10.33029/9704-8538-5-ASC-2025-1-1072.

18. Инфекции в хирургии. Диагностика, лечение, профилактика. Практическое руководство / под ред. С. Бартоли, Ф. Кортеше, М. Сартелли, Г. Сганга ; пер. с англ. под ред. А. Н. Тулупова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2026. — 192 с. : ил. — DOI: 10.33029/9704-9557-5-IIS-2026-1-192.

Интернет-ресурсы:

Базы данных и информационно-справочные системы:

1. <http://criticalmedicine.karelia.ru/> - Школа критической медицины Карелии профессора А.П.Зильбера
2. <http://rusanesth.com/> - Русский анестезиологический сервер
3. <http://www.cito03.ru/> - Национальное Научно-практическое общество скорой медицинской помощи
4. <http://www.critical.ru/> - Сайт медицины критических состояний
5. <http://www.emergencyrus.ru/> - Российское общество скорой медицинской помощи.
6. <http://www.medmir.com/> - Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке
7. <http://www.rusmedserv.com/> - Русский медицинский сервер
8. <http://www.scopus.com/home.ur/> - база данных рефератов и цитирования Scopus
9. <https://elibrary.ru/defaultx.asp> - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты
10. <http://www.infostat.ru/> - Электронные версии статистических публикаций
11. <http://www.cir.ru/index.jsp> - Университетская информационная система РОССИЯ
12. <http://diss.rsl.ru/> - Электронная библиотека диссертаций РГБ

13. <http://consultant.ru/> - Электронная информационно-правовая база
14. <http://общество-хирургов.рф> – Российское общество хирургов
15. Брюсов П.Г., Тулупов А.Н., Самохвалов И.М. и др. Клинические рекомендации Минздрава РФ «Закрытая травма грудной клетки», 2021
https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/728_1

Сайты журналов:

16. <http://wwrsj.elpub.ru> – Российский хирургический журнал
17. <https://www.mediasphera.ru/journal/khirurgiya-zhurnal-im-n-i-pirogova> Журнал им. Н.И. Пирогова)
18. <https://www.surgonco.ru/> Креативная хирургия и онкология
19. <https://www.vestnik-grekova.ru/> Вестник хирургии им. И.И. Грекова
20. <https://surgery.by/> Новости хирургии
21. <https://tcs-journal.com/> Грудная и сердечно-сосудистая хирургия
22. <https://hepato.elpub.ru/jour/> Анналы хирургической гепатологии
23. <https://vestnik-surgery.com/index.php/journal/index> Вестник экспериментальной и клинической хирургии
24. <https://www.cesurg.ru/> Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б.В. Петровского
25. <https://www.mediasphera.ru/journal/endoskopicheskaya-khirurgiya> Эндоскопическая хирургия
26. <https://emergency.spb.ru/manh/manh-journal/> Журнал «Неотложная хирургия им. И.И. Джанелидзе»

Электронные базы данных:

- 1 <http://books-up.ru/>
- 2 <http://e.lanbook.com/>
- 3 <http://www.1spbgmu.ru/>
- 4 <http://www.emergencyrus.ru/>
- 5 <http://www.studentlibrary.ru/>
- 6 <https://mvsystem.ru/>
- 7 <https://www.medznat.ru/>

6.3 Требования к кадровым условиям реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается работниками Института, осуществляющими образовательную деятельность, и (или) лицами, привлекаемыми на иных условиях.

Квалификация работников Института, реализующих Программу, отвечает квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н^{III}, и профессиональным стандартам.

Лекции проводятся лицами, имеющими ученую степень кандидата или доктора медицинских наук, при этом:

1) лекции модулей 1-3 проводятся лицами, имеющими действующую аккредитацию по специальности «Хирургия», осуществляющими медицинскую деятельность по специальности «Хирургия», имеющими медицинский стаж работы по специальности

«Хирургия» не менее 5 лет;

2) лекции модуля 4 проводятся лицами, имеющими действующую аккредитацию по одной из специальностей: «Анестезиология-реаниматология», «Скорая медицинская помощь», осуществляющими медицинскую деятельность по одной из специальностей: «Анестезиология-реаниматология», «Скорая медицинская помощь» и имеющими стаж такой деятельности не менее 3 лет.

Не менее 40 % объема занятий семинарского типа проводятся лицами, имеющими ученую степень кандидата или доктора медицинских наук.

Занятия семинарского типа модуля 4 проводятся в группе обучающихся численностью не более 10 человек лицами, имеющими аккредитацию по одной из специальностей: «Анестезиология-реаниматология», «Скорая медицинская помощь», осуществляющими медицинскую деятельность по одной из специальностей: «Анестезиология-реаниматология», «Скорая медицинская помощь» и имеющими стаж такой деятельности не менее 3 лет.

6.4. Требования к кадровому обеспечению реализации Программы в части практической подготовки:

Занятия семинарского типа модулей 1 - 3, предусматривающие практическую подготовку в соответствии с учебным планом, проводятся в группе обучающихся численностью не более 10 человек лицами, имеющими аккредитацию по специальности «Хирургия», осуществляющими медицинскую деятельность по специальности «Хирургия» и имеющими стаж такой деятельности не менее 5 лет.

Модуль 5 проводится в группе обучающихся численностью не более 5 человек лицами, имеющими аккредитацию по специальности «Хирургия», осуществляющими медицинскую деятельность по специальности «Хирургия» и имеющими стаж такой деятельности не менее 5 лет.

По решению Института модуль 5 может проводиться полностью или частично в форме стажировки.¹²

6.5 Требования к материально-техническому обеспечению реализации Программы:

Институт обеспечивает соблюдение следующих требований к материально-техническим условиям реализации Программы.

Модуль	Требования к материально-техническим условиям реализации Программы
Модуль 1. Актуальные вопросы медицинского обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и диагностики хирургических заболеваний и(или)состояний	1. Наличие учебных аудиторий площадью не менее 2,5 кв. м. на одного обучающегося, оснащенных видеопроекционной аппаратурой и неограниченным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 2. Наличие комплекта лицензионного программного обеспечения, включая свободно распространяемое, в том числе отечественного производства: операционная система, текстовый редактор, редактор презентаций, учебная медицинская информационная система. Наличие тренажеров (симуляторов, манекенов, моделей),
Модуль 2. Актуальные вопросы хирургического лечения и медицинской реабилитации	

Модуль	Требования к материально-техническим условиям реализации Программы
Модуль 3. Актуальные вопросы организации работы врача-хирурга. Медицинская экспертиза в хирургии	позволяющих формировать следующие умения: пункция плевральной, брюшной, перикардиальной полостей, суставов; катетеризация мочевого пузыря и периферических вен; первичная хирургическая обработка, наложение швов, вскрытие абсцессов, биопсия, удаление поверхностных образований; наложение кишечного и сосудистого анастомоза, грыжесечение; наложение гипсовых и иммобилизационных повязок при переломах.
Модуль 4. Современные технологии оказания медицинской помощи в экстренной форме	1. Наличие учебных аудиторий площадью не менее 2,5 кв. м. на одного обучающегося, оснащенных видеопроекционной аппаратурой и неограниченным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 2. Наличие комплекта лицензионного программного обеспечения, включая свободно распространяемое, в том числе отечественного производства: операционная система, текстовый редактор, редактор презентаций, учебная медицинская информационная система. 3. Наличие тренажеров (симуляторов) с обратной связью для оказания медицинской помощи в экстренной форме, позволяющих формировать следующие умения: определение наличия признаков жизни; обеспечение проходимости дыхательных путей; временная остановка наружного кровотечения; проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей; использование автоматического наружного дефибриллятора; наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки; промывание желудка; придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего в зависимости от его состояния.

6.6 Требования к материально-техническому обеспечению реализации Программы в части практической подготовки:

Практическая подготовка обучающихся при реализации Программы обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельности¹¹ в медицинских организациях и (или) иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья:

Наименование модулей, тем, разделов практики	Требования к базам практической подготовки и их мощности в расчете на 1 обучающегося при реализации Программы
Модуль 1. Актуальные вопросы медицинского обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний	
Темы, предусматривающие практическую подготовку	Осуществление медицинской деятельности, предусматривающей: 1) организацию и выполнение работ (услуг) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях (наличие соответствующей лицензии) по: хирургии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 2) организацию и выполнение работ (услуг) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях (наличие соответствующей лицензии) по хирургии; 3) не менее 1 занятой штатной единицы должности врача-хирурга на 5 обучающихся.
Модуль 2. Актуальные вопросы хирургического лечения и медицинской реабилитации	

Наименование модулей, тем, разделов практики	Требования к базам практической подготовки и их мощности в расчете на 1 обучающегося при реализации Программы
Темы, предусматривающие практическую подготовку	1. Осуществление медицинской деятельности, предусматривающей: 1) организацию и выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (наличие соответствующей лицензии) по: хирургии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 2) не менее 1 занятой штатной единицы должности врача-хирурга на 5 обучающихся. 2. Осуществление медицинской деятельности, предусматривающей: 1) организацию и выполнение работ (услуг) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях (наличие соответствующей лицензии) по: хирургии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 2) организацию и выполнение работ (услуг) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях (наличие соответствующей лицензии) по хирургии; 3) не менее 1 занятой штатной единицы должности врача-хирурга на 5 обучающихся.
Модуль 3. Актуальные вопросы организации работы врача-хирурга. Медицинская экспертиза в хирургии	
Темы, предусматривающие практическую подготовку	1. Осуществление медицинской деятельности, предусматривающей: 1) организацию и выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (наличие соответствующей лицензии) по: хирургии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 2) организацию и выполнение работ (услуг) при проведении медицинских экспертиз (наличие соответствующей лицензии) по экспертизе временной нетрудоспособности; 3) не менее 1 занятой штатной единицы должности врача-хирурга на 5 обучающихся. 2. Осуществление медицинской деятельности, предусматривающей: 1) организацию и выполнение работ (услуг) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
Модуль 5. Практика	
5.1. Оказание медицинской помощи по профилю «хирургия» в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара	1. Осуществление медицинской деятельности, предусматривающей: 1) организацию и выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (наличие соответствующей лицензии) по хирургии; 2) организацию и выполнение работ (услуг) при проведении медицинских экспертиз (наличие соответствующей лицензии) по экспертизе временной нетрудоспособности; 3) организацию и выполнение работ (услуг) при проведении медицинских осмотров (наличие соответствующей лицензии) по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 4) не менее 1 занятой штатной единицы должности врача-хирурга на 5 обучающихся. 2. Осуществление медицинской деятельности, предусматривающей: 1) организацию и выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и (или) специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара (наличие соответствующей лицензии) по хирургии; 2) организацию и выполнение работ (услуг) при проведении

Наименование модулей, тем, разделов практики	Требования к базам практической подготовки и их мощности в расчете на 1 обучающегося при реализации Программы
	медицинских экспертиз (наличие соответствующей лицензии) по экспертизе временной нетрудоспособности; 3) не менее 1 занятой штатной единицы должности врача-хирурга на 5 обучающихся.
5.2. Оказание медицинской помощи по профилю «хирургия» в стационарных условиях	Осуществление медицинской деятельности, предусматривающей: 1) организацию и выполнение работ (услуг) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях (наличие соответствующей лицензии) по хирургии; 2) организацию и выполнение работ (услуг) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях (наличие соответствующей лицензии) по хирургии; 3) организацию и выполнение работ (услуг) при проведении медицинских экспертиз (наличие соответствующей лицензии) по экспертизе временной нетрудоспособности; 4) не менее 1 занятой штатной единицы должности врача-хирурга на 5 обучающихся.

VII. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ⁸

Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится в форме устного опроса. Промежуточная аттестация по модулю 2 включает в себя решение тестовых заданий, ситуационных задач, демонстрацию умений в симулированных и клинических условиях в соответствии с содержанием модулей и планируемыми результатами обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования, которое включает в себя решение тестовых заданий, ситуационных задач, демонстрацию умений в симулированных и клинических условиях. Итоговая аттестация проводится для оценки степени достижения обучающимися запланированных результатов обучения по Программе и выявляет теоретическую и практическую подготовку обучающегося. Обучающийся допускается к итоговой аттестации при успешном прохождении промежуточной аттестации и выполнении учебного плана.

Обучающийся, освоивший Программу и успешно прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации⁹.

Оценочные материалы Программы созданы в соответствии с содержанием модулей и планируемыми результатами обучения. Каждое задание оценочных материалов соотнесено с результатами обучения, для оценки которых оно предназначено.

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

8.1 Пример критериев оценивания и представления оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде	Примерные критерии оценивания
1	Текущий контроль (опрос)	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и	Вопросы по темам/разделам дисциплины	Полнота раскрытия темы; знание основных понятий в рамках обсуждаемого вопроса, их взаимосвязей между собой и с другими

⁸ Пункт 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

⁹ Пункт 1 части 10 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде	Примерные критерии оценивания
		рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.		вопросами дисциплины (модуля); знание основных методов изучения определенного вопроса; знание основных практических проблем и следствий в рамках обсуждаемого вопроса; наличие представления о перспективных направлениях разработки рассматриваемого вопроса
1.	Ситуационные задачи	Проблемная задача на основе реальной профессионально-ориентированной ситуации, имеющая варианты решений. Позволяет оценить умение применить знания и аргументированный выбор варианта решения	Набор ситуационных задач по темам/разделам	Грамотность определения содержащейся в задаче проблемы; корректность оперирования профессиональной терминологией при анализе и решении задачи; адекватность применяемого способа решения ситуационной задачи
2.	Тестовое задание	Система заданий, позволяющая стандартизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий (варианты)	Критерии оценки вопросов теста в зависимости от типов формулируемых вопросов.
3.	Практические навыки	Обследование стандартизованного пациента	Стандартизованный пациент (варианты)	Знание основных методов изучения предложенной патологии; жалобы и анамнез хирургических больных; общий осмотр хирургического больного; оценка хирургического статуса. Диагностические навыки: физикальное обследование пациента, подготовка пациента к исследованиям, наличие представления о необходимости дополнительных методов обследования. Манипуляционная техника: остановка кровотечения, первичная хирургическая обработка ран, катетеризация сосудов и мочевого пузыря, наложение повязок и иммобилизация, определение группы крови и

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде	Примерные критерии оценивания
				резус-фактора, проведение проб на совместимость. Оперативная техника: владение хирургическим инструментарием; техника разрезов, соединения тканей, наложения швов; выполнение конкретных операций. Неотложные состояния: оказание первой помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, отморожениях; сердечно-лёгочная реанимация; действия при острых хирургических патологиях. Организационные и вспомогательные навыки: ведение медицинской документации: история болезни, дневники, эпикризы; организация противоэпидемических мероприятий; расчёт и коррекция инфузионной терапии.
4.	Активные формы обучения	Метод Кейс-стади (ситуационное обучение)	Описание ситуации в форме текста, видеоматериала, иллюстрации и т.д. Задание по анализу ситуации Оценочный лист с позициями для фиксирования решения	Критерии оценки анализа ситуации Лист наблюдения за деятельностью, если необходим
		Рольевые (деловые) игры	Описание роли Задание в игре	Сценарий игры Лист наблюдения за деятельностью
		Тренинг	Тематики тренинга	Сценарий тренинга Требования к результатам освоения тренинга
		Компьютерные симуляции	Оборудование для проведения симуляции Инструкции по использованию оборудования	Критерии успешного прохождения симулятора

8.2 Примеры шкал оценивания

Практика

Оценка	Описание
--------	----------

Оценка	Описание
«отлично»	Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
«хорошо»	Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
«удовлетворительно»	Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены.
«неудовлетворительно»	Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. Нет ответа. Не было попытки решить задачу

Собеседование/семинар

Оценка	Описание
«отлично»	Оценка «отлично» ставится в том случае, когда обучающийся исчерпывающе знает весь программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) дает правильные, сознательные и уверенные ответы. В различных практических заданиях умеет самостоятельно пользоваться полученными знаниями. В устных ответах и письменных работах пользуется литературно правильным языком и не допускает ошибок.
«хорошо»	Оценка «хорошо» ставится в том случае, когда обучающийся знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) отвечает без затруднений. Умеет применять полученные знания в практических заданиях. В устных ответах пользуется литературным языком и не делает грубых ошибок. В письменных работах допускает только незначительные ошибки.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает знание основного программного учебного материала. При применении знаний на практике испытывает некоторые затруднения и преодолевает их с небольшой помощью преподавателя. В устных ответах допускает ошибки при изложении материала и в построении речи. В письменных работах делает ошибки.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает незнание большей части программного материала, отвечает, как правило, лишь на наводящие вопросы преподавателя, неуверенно. В письменных работах допускает частые и грубые ошибки.

Тестовые задания

Границы в процентах	Оценка
90-100	Отлично
80-89	Хорошо
70-79	Удовлетворительно
0-69	Неудовлетворительно

Ситуационная задача

Оценка	Описание
«отлично»	Объяснение хода решения ситуационной задачи подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями, с необходимым схематическими изображениями и наглядными демонстрациями, с правильным и свободным владением терминологией; ответы на дополнительные вопросы верные, четкие
«хорошо»	Объяснение хода решения ситуационной задачи подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании, схематических изображениях и наглядных демонстрациях, ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно

	четкие
«удовлетворительно»	Объяснение хода решения ситуационной задачи недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием, со значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях и наглядных демонстрациях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях
«неудовлетворительно»	Объяснение хода решения ситуационной задачи дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования, без умения схематических изображений и наглядных демонстраций или с большим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют

8.3 Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку обучающегося:

1. Основные физиологические механизмы поддержания кислотно-щелочного равновесия.
2. Печеночная недостаточность: этиология, патогенез, принципы терапии.
3. Медицинское страхование: принципы, задачи, правовые аспекты.
4. Санитарно-противоэпидемическая работа в хирургической службе.
5. Этика и деонтология врача-хирурга.
6. Радиоизотопные методы исследования в хирургии.
7. Оперативные доступы к органам полости живота.
8. Операции при грыжах.
9. Виды, способы и методы анестезии. Обезболивание в амбулаторной хирургии и стационарах «одного дня».
10. Приемы и методы поддержания и восстановления жизненных функций организма.
11. Гемотрансфузионные осложнения и их профилактика.
12. Нагноительные заболевания легких и плевры.
13. Медиастинит: этиология, классификация, клиника. Методы диагностики, виды операций.
14. Паллиативные и радикальные операции при раке легкого.
15. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Диагностика и лечение.
16. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения, лечение.
17. Язвы тонкой кишки (неспецифические язвы, специфические язвы).
18. Острая кишечная непроходимость. Классификация.
19. Доброкачественные и злокачественные опухоли печени. Диагностика и лечение.
20. Хирургические методы лечения осложнений цирроза печени и портальной гипертензии.
21. Желчнокаменная болезнь. Эндоскопические методы лечения, миниинвазивные технологии.
22. Острый панкреатит. Этиология, классификация, клиника. Дифференциальная диагностика осложнений острого панкреатита.
23. Общее учение о грыжах. Диагностика. Хирургическое лечение.
24. Применение лазерной техники в хирургической практике.
25. Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы.
26. Классификация и клинические особенности гнойно-воспалительных заболеваний кожи, подкожной клетчатки и фасциальных пространств.
27. Синдром длительного сдавления.
28. Острый панкреатит. Классификация. Патоморфология. Современные принципы диагностики и лечения.

29. Дифференциальная диагностика и терапия коматозных состояний у детей.
30. Травматический шок: этиология и патогенез.
31. Классификация ожогов.
32. Методы оценки тяжести ожогового поражения и прогнозирования исходов травмы.
33. Местное поражение холодом (Отморожения). Классификация, диагностика, лечение.
34. Понятие ожоговой болезни, патогенез, периодизация, осложнения.
35. Вопросы микробиологии раневой инфекции.
36. Физические методы воздействия на рану. Современные технологичные методы.
37. Хирургический сепсис. Классификация, диагностика, лечение.
38. Гнойная хирургическая инфекция у больных с сахарным диабетом.
39. Травма черепа и головного мозга. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника.
40. Тромбозы и эмболии при травме.
41. Особенности обследования онкологических больных.
42. Внематочная беременность. Этиология, классификация, клиника. Дифференциальная диагностика.
43. Дифференциальная диагностика анурий.
44. Облитерирующий тромбангиит.
45. Виды сосудистой травмы.
46. Дифференциальная диагностика и терапия коматозных состояний.

8.4 Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающегося:

1. Выберите средства и рассчитайте объем инфузионной терапии при ожоговом шоке у пациента с массой тела 80 кг и площадью ожогов 70% п.т., из которых 20% п.т. глубокие.
2. Порядок лечебных мероприятий при оказании помощи пострадавшим с холодовой травмой на догоспитальном этапе.
3. Послеоперационный период – основные принципы наблюдения и уход за больными.
4. Перечислите основные препараты для тотальной внутривенной анестезии.
5. Перечислите основные диагностические мероприятия у пациента с подозрением на тромбоз глубоких вен нижних конечностей.
6. Перечислите основные диагностические мероприятия у пациента с переломом таза.
7. Перечислите основные диагностические мероприятия у пациента с острой кишечной непроходимостью.
8. Перечислите основные диагностические мероприятия у пациента с подозрением на острый панкреатит.
9. Алгоритм обследования в приемной отделении пациента с болями в животе.
10. Выбор средств и расчет инфузионной терапии у пациента с травматическим шоком.
11. Порядок действий при сердечно-легочной реанимации.
12. Алгоритм лечения общего переохлаждения.
13. Перечислите основные диагностические мероприятия у пациентки с подозрением на внематочную беременность.
14. Перечислите основные диагностические мероприятия у пациента с подозрением на ТЭЛА.
15. Перечислите основные диагностические мероприятия у пациентки с подозрением на рак молочной железы.

8.5 Примерный перечень вопросов теоретической части итоговой аттестации

1. Диагностика и лечение перфоративной язвы желудка и 12-перстной кишки
2. Диагностика и лечение острых желудочных кровотечений
3. Диагностика и лечение острых кишечных кровотечений
4. Диагностика и лечение острого аппендицита

5. Диагностика и лечение острой кишечной непроходимости
6. Диагностика и лечение острого холецистита
7. Диагностика и лечение ущемленных грыж живота
8. Особенности диагностики и лечения ущемленных вентральных грыж живота
9. Диагностика и лечение острого панкреатита
10. Особенности лечения тяжелого острого панкреатита
11. Клинико-морфологические особенности современных огнестрельных повреждений и обоснование хирургической тактики при них.
12. Клинические и морфологические закономерности течения раневого процесса и принципы лечения в различные его фазы.
13. Основные факторы, влияющие на возникновение и тяжесть травматического шока. Другие виды тяжести состояний при политравме.
14. Клинические формы местной и генерализованной гнойной раневой инфекции.
15. Классификация и клинические формы анаэробной инфекции. Профилактика и принципы лечения
16. Определение травматической болезни и основные закономерности её течения. Роль хирургического лечения в предупреждении и лечении различных осложнений в разные периоды травматической болезни.
17. Особенности инфузионно-трансфузионной терапии при политравме
18. Понятие, виды и этапы хирургической обработки ран. Виды хирургических швов и показания к их наложению.
19. Хирургическая тактика при лечении ранений и закрытых повреждений черепа и головного мозга. Особенности медицинской сортировки
20. Классификация и патофизиологические расстройства при ранениях и закрытых повреждениях груди. Показания к консервативному и оперативному лечению
21. Классификация ранений и закрытых повреждений живота. Диагностика и хирургическая тактика при повреждениях внутренних органов.
22. Классификация травм конечностей. Хирургическая тактика при открытых и закрытых повреждениях костей конечностей.
23. Классификация закрытых повреждений таза. Хирургическая тактика при продолжающемся внутритазовом кровотечении.
24. Классификация ранений таза. Хирургическая тактика при повреждениях органов таза.
25. Клиника, диагностика и хирургическая тактика при повреждениях магистральных сосудов конечностей.
26. Понятие и патогенез реберного клапана. Классификация, виды и хирургическая тактика.
27. Особенности сочетанных повреждений позвоночника. Хирургическая тактика и профилактика осложнений.
28. Ранения шеи. Хирургическая тактика при повреждениях сосудов и органов шеи.
29. Особенности хирургического лечения огнестрельных ранений живота.
30. Консервативная тактика лечения повреждений органов живота.

8.6 Примеры тестовых заданий

Внимательно прочитайте вопрос, дайте один правильный ответ.

№	Вопрос (задание)	Варианты ответов	Правильный ответ	Коды результатов обучения
1	Абсолютным признаком нежизнеспособности кишечника при острой кишечной	А. тромбоз сосудов брыжейки Б. отсутствие кишечной перистальтики В. отсутствие пульсации краевых сосудов брыжейки Г. отсутствие отхождения кала и газов	Б	1.34
2	Классификация ожогов по глубине поражения (МКБ), предусматривает степени:	А. I, II, III, IV; Б. I, ПА, ПБ, III, IV; В. I, II, ША, ШБ, IV; Г. 0, I, II, III. Д. I, ПА, ПБ, III	Г	1.33, 2.33
3	Парафимоз - это:	А. сужение отверстия крайней плоти полового члена; Б. ущемление головки полового члена суженной крайней плотью; В. воспаление кавернозного тела уретры и головки полового члена; Г. воспаление вен полового члена; Д. сужение и воспаление крайней плоти.	Б	1.33, 2.33
4	После установления диагноза острого гнойного медиастинита в первую очередь необходимы:	А. массивная антибиотикотерапия; Б. иммунотерапия; В. дезинтоксикационная терапия; Г. хирургическое лечение; Д. гемотрансфузия.	Г	2.32, 2.33
5	Антибактериальную терапию при сепсисе следует начинать:	А. при положительных посевах крови; Б. после получения антибиотикограмм; В. при обнаружении первичного очага или метастатических гнойников; Г. с момента установления диагноза; Д. при неадекватном вскрытии первичного очага.	Г	2.35, 2.у3, 2.у5, 2.у6
6	Типичными местами расположения околощитовидных желез являются:	А. задняя поверхность верхних и нижних полюсов обеих долей щитовидной железы; Б. задняя поверхность щитовидной железы; В. подчелюстная поверхность; Г. передняя поверхность верхних полюсов щитовидной железы; Д. передняя поверхность нижних полюсов щитовидной железы.	А	1.38, 1.39
7	На отдаленные результаты хирургического лечения злокачественных опухолей оказывает	А. тип роста опухоли; Б. гистологическая структура опухоли; В. наличие метастазов в региональных лимфоузлах; Г. наличие отдаленных метастазов; Д. возраст больного.	Д	2.310, 2.у13

№ п.п .	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
1	Кортико-висцеральная теория этиопатогенеза язвенной болезни предложена К.М. Быковым и И.Т.Курциным в:	1860 году	1908 году	1949 году	1971 году	1982 году	3	2
2	Нормальная базальная кислотная продукция желудка для мужчин составляет (в мэкв/ч):	1,5-5,5	0,5-2,0	4,5-8,0	более 10	менее 1	1	2
3	Каково нормальное соотношение базальной кислотной продукции (BAO) к максимальной?	6:1	1:1	1:6	1:5	1:2	3	2
4	Какой секреторный показатель наиболее полно отвечает задаче оценки морфологического состояния слизистой оболочки желудка?	BAO	SAO	MAO	GUT	HOU	3	2
5	Какое преобладающее состояние кислотно-пептического фактора при возникновении хронической язвы тела желудка?	Нормальный	Усилен	Ослаблен	Не имеет значения		3	2
6	Какое преобладающее состояние кислотно-пептического фактора при возникновении хронической язвы двенадцатиперстной кишки?	Нормальный	Усилен	Ослаблен	Не имеет значения		2	2
7	Кто чаще страдает хронической язвой двенадцатиперстной кишки?	Мужчины	Женщины	Пожилые	Дети	Подростки	1	2
8	Клиническая картина язвенной болезни зависит от:	степени воспалительного процесса	распространенность и воспаления	локализации язвы	возраста пациента	всех вышеперечисленных факторов	5	2

№ п.п .	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
9	Максимальное подавление кислотообразующей функции желудка достигается назначением блокаторов:	гастриновых рецепторов	H ₂ -гистаминовых рецепторов	M-холино-рецепторов	H-холинорецепторов	протонной помпы	5	2
10	Какая операция предпочтительна при осложненной хронической язве двенадцатиперстной кишки:	Селективная проксимальная ваготомия без дренирующей операции	Резекция желудка (в модификации Бильрот-I или Бильрот-II)	Иссечение язвы с дуоденопластикой (мостовидной или сегментарной)	Ушивание язвы	Стволовая ваготомия с дренирующей желудок операцией	5	2
11	Начало широкого применения в клинической практике стволовой ваготомии связано с работами:	L. Dragstedt	R. Swithwik	L. Edwards	G. Deventer	K. Bernard	1	2
12	Как часто малигнизируются хронические язвы желудка?	В 10-15% случаев	В 15-20% случаев	В 20-30% случаев	В 30-40% случаев	В 40-45% случаев	1	2
13	Как часто рецидивируют язвы двенадцатиперстной кишки после ваготомии?	В 1-5% случаев	В 10-15% случаев	В 15-20% случаев	В 20-30% случаев	В 30-40% случаев	2	2
14	При сочетании хронической язвы желудка с хронической язвой двенадцатиперстной кишки первичной и определяющей в выборе хирургической тактики является:	язва желудка	язва двенадцатиперстной кишки	нет закономерностей			3	2
15	Наибольшей диагностической ценностью при обследовании больного с хронической язвой двенадцатиперстной кишки обладает:	осмотр	пальпация	перкуссия	аускультация	сбор жалоб и анамнеза	5	2

№ п.п.	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
16	Среди лабораторных методов обследования больного с хронической язвой двенадцатиперстной кишки наибольшей диагностической ценностью обладает исследование:	желудочной секреции	дуоденального содержимого	кала	переваривающей и всасывающей функции кишечника	протеолитической активности желудочного сока	1	2
17	Где проходит левая желудочная артерия?	В печечно-двенадцатиперстно-кишечной связке	В поджелудочно-желудочной связке	В малом сальнике	В желудочно-ободочной связке	В большом сальнике	2	2
18	Что является самым частым осложнением стрессовой язвы желудка?	Кровотечение	Перфорация	Пенетрация	Малигнизация	Стеноз	1	2
19	Типичным интраоперационным осложнением селективной проксимальной ваготомии является:	перфорация пищевода	повреждение нерва Латарже	повреждение левой желудочной артерии	повреждение правой желудочной артерии	повреждение общей печеночной артерии	2	2
20	Является ли декомпенсированный стеноз привратника абсолютным показанием к оперативному лечению?	да	нет	Вопрос окончательно не решен			1	2
21	Укажите ведущий клинический признак пилоростеноза?	Одышка	Тошнота	Рвота	Цианоз	Запоры	3	2
22	Где наиболее часто образуются хронические язвы?	В кардиальном отделе желудка	В теле желудка	В антральном отделе желудка	В луковице двенадцатиперстной кишки	В залуковичном отделе двенадцатиперстной кишки	4	2
23	Какой способ резекции желудка предпочтителен при желудочных язвах?	По Бильрот-1	По Бильрот-2 на короткой петле	По Бильрот-2 на длинной петле с Брауновским соустьем	Ни один из вышеперечисленных		1	2

№ п.п.	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
24	К какому типу по классификации Джонсона относится сочетание язвы двенадцатиперстной кишки и язвы желудка?	Тип I	Тип II	Тип III			2	2
25	При каких язвах желудка следует проводить дифференциальную диагностику с синдромом Цоллингера-Эллисона?	При хронических язвах кардии	При хронических язвах тела желудка	При острых язвах тела желудка	При острых язвах кардии	При сочетании язвы желудка с язвой двенадцатиперстной кишки	5	2
26	Как часто малигнизируются дуоденальные язвы?	Никогда	Крайне редко	В 2-5% случаев	В 5-10% случаев	В 10-20% случаев	2	2
27	Чем чаще всего осложняются пептические язвы гастроэнтероанастомоза?	Перфорацией	Кровотечением	Малигнизацией	Пенетрацией	Стенозом	2	2
28	Какой способ дренирующей желудка операции наименее предпочтителен при стволовой ваготомии?	По Гейнеке-Микуличу	По Джадду	По Финнею	По Джабулею	Гастроеюностомия	5	2
29	Какова послеоперационная летальность после плановой дистальной резекции желудка?	0,5-1%	3-5%	10-15%	15-20%	20-30%	2	2
30	Какова летальность после плановой ваготомии с пилоропластикой?	0,3-0,6%	1-3%	5-10%	10-15%	15-20%	1	2
31	Какое заболевание, связанное со стволовой ваготомией, может развиваться в отдаленные сроки после операции?	Цирроз печени	Желчнокаменная болезнь	Мочекаменная болезнь	Хронический билиарный панкреатит	Доброкачественные опухоли пищевода	2	2

№ п.п.	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
32	Абсолютным показанием к операции при гастродуоденальных язвах является:	наличие газа в желчных протоках	сочетание язвы с холециститом или панкреатитом	субкомпенсированный стеноз выходного отдела желудка	отрицательный гистаминовый тест Кея	положительный гистаминовый тест Кея	1	2
33	Образование камней в желчном пузыре после ваготомии наиболее характерно для:	мужчин	женщин	детей	подростков	Точной зависимости не установлено	2	2
34	За счет какой фазы желудочной секреции вырабатывается соляная кислота при дуоденальной язве?	Главным образом за счет первой фазы	Главным образом за счет второй фазы	Одинаково зависит от обеих фаз	Четкой зависимости не установлено		1	2
35	Какой вид резекции желудка сопровождается наибольшим числом пострезекционных расстройств?	По Бильрот I	По Бильрот II на короткой петле	По Бильрот II на длинной петле с брауновским соустьем	По Ру	Четкой зависимости не установлено	2	2
36	Какое число больных резекция желудка избавляет от язвенной болезни?	100%	90-95%	70-80%	60-70%	50-60%	2	2
37	Какая проба свидетельствует о неэффективности ваготомии?	Бензогексонием	Гистамином	Инсулином	Глюкозой	Все вышеперечисленные пробы	3	2
38	Наиболее эффективным препаратом для лечения атонии желудка после ваготомии является:	бензогексоний	гистамин	инсулин	питуитрин	глутаминовая кислота	1	2
39	Постваготомическая диарея наиболее эффективно поддается лечению:	гистамином	инсулином	питуитрином	бензогексонием	резекцией желудка	4	2
40	По отношению к брюшине червеобразный отросток	интраперитонеальный	мезоперитонеально	ретроперитонеально	экстраперитонеально		1	2

№ п.п .	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
	расположен:							
41	Какое наиболее частое расположение червеобразного отростка?	Нисходящее (каудальное)	Боковое (латеральное)	Внутреннее (медиальное)	Переднее (вентральное)	Заднее (дорзальное)	1	2
42	Наибольшее распространение в хирургической практике нашла классификация острого аппендицита:	П.Н. Напалкова	В.И. Колесова	А.И. Абрикосова	В.П. Образцова	Г.В. Шора	2	2
43	Какая наиболее частая окончательная локализация болей при остром аппендиците?	В правой подвздошной области	В подложечной области	В пупочной области	Внизу живота	По всему животу	1	2
44	Первичная локализация болей в подложечной области особенно часто наблюдается при:	простом аппендиците	деструктивном аппендиците	вторичном аппендиците			2	2
45	Температура тела при остром аппендиците, как правило, колеблется в пределах:	36-37 С°	37-38 С°	38-39 С°	свыше 39 С°		2	2
46	"Пахово-мошоночный симптом" для определения воспалительного состояния брюшины при остром аппендиците называется симптомом:	Габай	Куленкампа	Крымова	Яуре-Розанова	Думбадзе	3	2
47	"Симптом скольжения" для диагностики острого аппендицита впервые предложил:	Н.Н. Фомин	А.С. Черемской	М.И. Островский	В.М. Воскресенский	В.И. Колесов	4	2

№ п.п.	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
48	Диагностические ошибки при остром аппендиците в основном объясняются:	слабой подготовкой медперсонала	атипичным течением заболевания	Пренебрежением рентгенологическим исследованием	недостаточно полным клиническим обследованием больного	отсутствием необходимой диагностической аппаратуры	2	2
49	Наиболее часто симулирует острый аппендицит:	флегмона желудка	острый илеит	мочекаменная болезнь	внематочная беременность	правосторонняя плевропневмония	3	2
50	Больных острым аппендицитом необходимо оперировать:	через 12-24 часа от начала заболевания	только при повторных приступах острого аппендицита	только при наличии перитонеальных симптомов	срочно при установленном диагнозе	только при наличии лейкоцитоза и признаков общей интоксикации	4	2
51	Какие клинические аспекты острого аппендицита являются наиболее спорными?	Тактика при аппендикулярном инфильтрате	Показания к операции при установленном диагнозе острого аппендицита	Тактика при аппендикулярном абсцессе	Вопрос о существовании катарального аппендицита	Выбор оптимального метода обезболивания	4	2
52	В каком % случаев при рутинной рентгенографии свежие переломы ребер выявить не удастся?	10%	25%	40%	50%	60%	2	2
53	Какие растворы местных анестетиков используются при межреберной и паравerteбральной анестезии?	0,25%	0,5%	1%	5%	10%	3	2
54	Какой реберный клапан наиболее опасен для жизни?	Переднебоковой	Односторонний	Задний	Переднебоковой билатеральный	Боковой	4	2
55	Какой метод фиксации реберного клапана используется в остром периоде травматической болезни наиболее часто?	Скелетное вытяжение	Панельная фиксация	Внешняя фиксация	ИВЛ	Не используется вообще	4	2
56	Какой метод лечения закрытых	Интрамедуллярный	Внешняя	Накостный	Скелетное	Консервативное	5	2

№ п.п .	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
	переломов грудины используется наиболее часто?	остеосинтез	фиксация	металлоостеосинтез	вытяжение	лечение		
57	Что является показанием для наложения окклюзионной повязки по Банайтису?	Гемоторакс с наружным кровотечением	Закрытый пневмоторакс	Открытый пневмоторакс	Кровотечение из мягких тканей	Напряженный пневмоторакс	5	2
58	Что такое триада Бека?	Снижение артериального давления, повышение центрального венозного давления и глухость тонов сердца	Повышение артериального давления, снижение центрального венозного давления и глухость тонов сердца	Снижение артериального давления, повышение центрального венозного давления и тахикардия	Снижение артериального давления, повышение центрального венозного давления и ослабление дыхательных шумов	Снижение артериального давления, снижение центрального венозного давления и ослабление дыхательных шумов	1	2
59	Какой отдел аорты при закрытой травме груди повреждается наиболее часто?	Восходящая аорта	Дуга аорты	Перешеек аорты	Нисходящая аорта	Восходящая аорта и ее дуга	3	2
60	Методом выбора при лечении разрыва грудного отдела аорты является:	торакотомия и ушивание разрыва	стентирование сосуда	трансторакальное дренирование	открытое протезирование аорты	консервативное лечение	2	2
61	Какой темп выделения крови из плевральной полости по дренажам является показанием для неотложной торакотомии?	100 мл/час	250 мл/час	700 мл/час	800 мл/час	1000 мл/час	2	2
62	Когда необходимо выполнять лапароцентез при закрытой травме живота?	Всегда	При выявлении газа в свободной брюшной полости при рентгенографии	При выявлении в свободной брюшной полости при УЗИ большого количества жидкости	При выявлении в свободной брюшной полости при УЗИ небольшого количества жидкости	Никогда	4	2
63	Когда при закрытой травме живота необходимо произвести видеолaparоскопию?	При выявлении в свободной брюшной полости при УЗИ небольшого	При выявлении газа в свободной брюшной полости при рентгенографии	При выявлении в свободной брюшной полости при УЗИ большого количества	Всегда	Никогда	1	2

№ п.п .	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
		количества жидкости.		жидкости				
64	Когда при закрытой травме и ранениях живота применяется тактика Damage control?	Всегда	При тяжелых повреждениях внутренних органов независимо от состояния пациента	При тяжелых повреждениях внутренних органов, большой кровопотере и нестабильной гемодинамике	При разрывах полых органов	Никогда	3	2
65	При каком максимальном уровне систолического АД центральная гемодинамика считается нестабильной?	Ниже 100 мм тр. ст.	Ниже 90 мм рт. ст.	Ниже 80 мм рт. ст.	Ниже 70 мм рт. ст.	Ниже 70 мм рт. ст.	2	2
66	Какая операция производится при разрывах желудка?	Гастростомия	Резекция желудка	Гастроэюностомия	Шов раны желудка	Гастрэктомия	4	2
67	Какая операция производится при разрыве брыжейки тонкой кишки без признаков нежизнеспособности последней?	Энтеростомия	Резекция тонкой кишки	Шов брыжейки	Правосторонняя гемиколэктомия	Операция Гартмана	3	2
68	Какая операция производится при обширном разрыве толстой кишки с признаками гнойного перитонита?	Шов разрыва толстой кишки с экстраперитонизацией раны	Резекция кишки с первичным анастомозом	Операция Гартмана	Операция Микулича	Дренирование брюшной полости	3	2
69	Какая операция наиболее часто выполняется при разрыве прямой кишки при закрытой травме живота?	Операция Гартмана.	Шов кишки и экстраперитонизация ушитой раны	Шов раны кишки с наложением противоестественного ануса	Низкая передняя резекция прямой кишки	Операция Микулича	3	2
70	При какой патологии можно выявить положительную пробу Зельдовича?	Разрыв мочеточника	Внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря	Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря	Разрыв уретры	Разрыв матки	2	2
71	Какова частота торакоабдоминальных	5-10%.	10-15%.	15-20%.	20-30%.	Выше 30%	2	2

№ п.п .	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
	повреждений при проникающих ранениях груди?							
72	Характерной особенностью всех без исключения торакоабдоминальных ранений является повреждение:	печени	пищевода	диафрагмы	перикарда	лёгкого	3	2
73	Какие повреждения относятся к торакоабдоминальным?	С одновременными повреждениями органов груди и брюшной полости.	С одновременными повреждениями органов груди, живота и позвоночника	С одновременными повреждениями органов груди, диафрагмы, живота и/или позвоночника	С одновременными повреждениями органов груди, забрюшинного пространства и позвоночника	С одновременными повреждениями органов груди, плевры и позвоночника	3	2
74	При торакоабдоминальных ранениях чаще других повреждаются	Полые органы брюшной полости	Паренхиматозные органы брюшной полости	Забрюшинные органы живота	Органы средостения	Спинной мозг	1	2
75	Какие органы живота при разрывах диафрагмы перемещаются в плевральную полость наиболее часто?	Прямая кишка	Двенадцатиперстная кишка, большой сальник	Петли кишечника, большой сальник, желудок, селезенка, печень	Почки, надпочечники	Поджелудочная железа	3	2
76	На основании первичного осмотра раненого и с помощью физикальных методов исследования установить правильный диагноз возможно в:	5-20% случаев	20-30% случаев	35-40% случаев	50% случаев	Никогда	3	2
77	Сколько групп торакоабдоминальных ранений (симптомокомплексов) выделяет А. Ю. Созон-Ярошевич (1949):	2	3	4	5	6	4	2
78	Основными методами дооперационной диагностики	УЗИ и лапароцентез	физикальное исследование,	лабораторные методы	спирография	МРТ	2	2

№ п.п .	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
	торакоабдоминальной травмы являются:		рентгенография и СКТ					
79	Что можно выявить у пострадавшего с торакоабдоминальной травмой при перкуссии нижних отделов пораженной половины груди?	Ясный легочный звук	Коробочный звук	Тимпанит	Притупление перкуторного звука	Ничего	4	2
80	Что можно выявить у пострадавшего с торакоабдоминальной травмой при аускультации пораженной половины груди?	Легочное дыхание.	Полиморфные хрипы	Жесткое дыхание	Ничего	Ослабление дыхательных шумов и звуки перистальтики кишечника	5	2
81	При подозрении на торакоабдоминальный характер колото-резаного или огнестрельного ранения абсолютно необходимо в экстренном порядке выполнить:	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и плевральных синусов и МСКТ живота	МРТ живота	Видеоторакоскопию	Видеолапароскопию	Лапароцентез	1	2
82	Каковы основные рентгенологические признаки разрыва диафрагмы?	Коллапс легкого	Ателектаз легкого	Легочная инфильтрация	Релаксация и изменение контуров диафрагмы, перемещение органов живота в плевральную полость	Скопление жидкости в плевральной полости	4	2
83	Основными методами оперативной диагностики и лечения больших разрывов левой половины диафрагмы является:	лапароцентез	видеолапароскопия, лапаротомия, торакотомия	видеоторакоскопия, лапаротомия	лапаротомия	торакоцентез	3	2
84	Диагностическая видеолапароскопия при торакоабдоминаль-	немедленно.	после торакотомии	перед дренированием	после лапароцентеза	после дренирования	5	2

№ п.п .	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
	ных ранениях должна выполняться:			плевральной полости		плевральной полости		
85	Основным методом оперативного лечения разрывов правой половины диафрагмы является:	видеоторакоскопия	видеоторакоскопия, видеолапароскопия, лапаротомия, торакотомия	торакотомия	лапаротомия	видеолапароскопия	2	2
86	Какой из оперативных доступов наиболее целесообразен при «застарелых» (более 14 суток) разрывах и травматических грыжах диафрагмы?	Торакотомия	Видеоторакоскопия	Лапаротомия	Боковая тораколапаротомия в VII межреберье	Видеолапароскопия	4	2
87	Какие методы диагностики огнестрельных ранений правой половины диафрагмы наиболее информативны?	Обзорная рентгенография груди и живота	СКТ, торакоцентез	УЗИ	Лапароцентез	СКТ и видеоторакоскопия	5	2
88	При рентгенографии груди при торакоабдоминальных ранениях чаще всего обнаруживают:	пневмоторакс	жидкость в плевральной полости	высокое стояние куполов диафрагмы	ничего	инородное тело в плевральной полости	2	2
89	Каков алгоритм хирургической тактики при подозрении на повреждение паренхиматозных органов живота при закрытой торакоабдоминальной травме у пострадавших со стабильной гемодинамикой при отсутствии явных признаков наличия больших дефектов диафрагмы?	Лапароцентез, видеолапароскопия	Лапаротомия	МСКТ с внутривенным контрастированием, консервативное лечение при отсутствии признаков продолжающегося кровотечения, ангиография с эмболизацией при продолжающемся кровотечении	Выжидательная тактика	Торакотомия	3	2
90	Каков алгоритм хирургической тактики при подозрении на повреждение паренхиматозных	Лапароцентез, видеолапароскопия	Лапароцентез, торакоцентез, торакотомия.	УЗИ, лапароцентез, лапаротомия	Тораколапаротомия	УЗИ, лапароцентез, дренирование плевральной полости,	5	2

№ п.п .	Тестовый вопрос	Варианты ответов					№ правильного ответа	Степень сложности
		1	2	3	4	5		
	органов живота при закрытой торакоабдоминальной травме у пострадавших с нестабильной гемодинамикой?					видеолапароскопия, лапаротомия.		
91	При подозрении на гемо- и гемопневмоторакс в первую очередь всегда производят:	торакоцентез	торакотомию.	дренирование плевральной полости.	торакоскопию	тораколапаротомию	1	2

8.7 Примеры ситуационных задач

Инструкция: ознакомьтесь с условием задачи. На основании полученной информации дайте развернутые ответы на вопросы, приведенные ниже.

Ситуационная задача №1.

Условия

Анамнез: мужчина, 19 лет, поступил с жалобами на боли в правой подвздошной области, беспокоящие его на протяжении 2 суток. Боль возникла в эпигастральной области и к моменту осмотра переместилась в правую подвздошную область, стала постоянной. На протяжении суток дважды была рвота. В течение дня отмечается неоформленный стул. Кровотечения из прямой кишки нет.

Обследование: Температура тела 37,8° С, пульс 110 в минуту. Живот при пальпации болезненный в правой подвздошной области, здесь же - защитное напряжение мышц. Анализ мочи в норме.

Лабораторные исследования		
Показатель	Значение показателя у пациента	Норма
Гемоглобин	140 г\л	115-160
Количество лейкоцитов	17 x 10 ⁹	4-11
Тромбоциты	250 x10 ⁹	150-400
Натрий	136 ммоль\л	135-145
Калий	3,5 ммоль\л	3,5-5
Мочевина	5,0 ммоль\л	2,4 - 6
Креатинин	66ммоль\л	44-80
С-реактивный белок	18 мг\л	<5

Задания

1. Каков вероятный диагноз?
2. В чем заключается дифференциальная диагностика у данного пациента?
3. В чем особенности лечебной тактики у данного пациента?
4. Какие осложнения могут возникнуть при оперативном лечении у данного пациента?

Эталоны ответов

1. Острый аппендицит.
2. Дифференциальная диагностика проводится с мезаденитом, псоас-абсцессом, дивертикулитом Меккеля, болезнью Крона, острым холециститом, почечной коликой, пиелонефритом, радикулитом, плевритом.
3. Основное лечение - аппендэктомия, открытая или лапароскопическая. В предоперационном периоде - инфузионная терапия и обезболивание, антибиотикопрофилактика периоперационно.
4. Нагноение раны, формирование свища, внутрибрюшной или тазовый абсцесс, перитонит, парез кишечника, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, ТЭЛА, в отдаленном периоде - послеоперационная грыжа, спаечная непроходимость.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.311, 2.33, 2.310, 2.у10

Ситуационная задача № 2.

Условия

Пациент К., 58 лет, доставлен в приемное отделение с жалобами на интенсивные разлитые боли в животе, возникшие около 6 часов назад, многократную рвоту. В анамнезе – лапаротомия. Объективно: состояние средней тяжести. Живот вздут, напряжен, резко болезненный во всех отделах, определяется положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Перистальтика не выслушивается. По данным обзорной рентгенографии органов брюшной полости в вертикальном положении – множественные чаши Клойбера.

Задания

1. Сформулируйте предварительный диагноз, разработайте план экстренного обследования.
2. Перечислите первоочередные лечебные мероприятия на догоспитальном и госпитальном этапах.
3. Перечислите возможные причины данного состояния. Назовите дооперационный метод диагностики для уточнения причины данного состояния.
4. Обоснуйте показания к экстренному оперативному вмешательству. Укажите хирургическую тактику.

Эталоны ответов

1. Предварительный диагноз: Острая странгуляционная кишечная непроходимость, разлитой перитонит. План обследования: экстренные общий и биохимический анализы крови (включая амилазу, электролиты), электрокардиография, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, по показаниям – компьютерная томография.
2. Догоспитальный этап: запрет приема пищи и воды, транспортировка в хирургический стационар на носилках. Госпитальный этап: установка назогастрального зонда, инфузионная терапия для коррекции водно-электролитных нарушений и гиповолемии, подготовка к срочной операции.
3. Возможные причины: ущемленная грыжа, спаечная болезнь, заворот кишки, инвагинация, опухоль. Метод уточнения: компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием позволяет установить уровень и вероятную причину обструкции.
4. Показания к операции: клиника странгуляционной непроходимости с признаками перитонита. Хирургическая тактика: экстренная лапаротомия, ревизия брюшной полости, устранение причины непроходимости (рассечение спаек, резекция нежизнеспособного участка кишки), санация и дренирование брюшной полости.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.311, 2.33

Ситуационная задача № 3

Условия

В стационар доставлен пациент Н., 28 лет, который при обрушении потолка во время строительства получил удар балкой по голове. Состояние тяжелое. Раненый заторможен, спит, при окрике на вопросы отвечает вяло, односложно. АД – 150/90 мм рт. ст., пульс 88 уд/мин., ритмичный. Из левого наружного слухового прохода выделяется кровь с примесью ликвора. На волосистой части головы множественные поверхностные рвано-ушибленные раны. Кровотечения из них нет. Через 40 мин пребывания в медицинской роте отмечено ухудшение состояния: сознания отсутствует, появилась анизокория справа. АД – 170/100 мм рт. ст., пульс 46 уд/мин. Частота дыхания – 28 в минуту.

Задания

1. Сформулируйте диагноз.
2. Примите решение по медицинской сортировке раненого на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи.
3. Перечислите необходимые мероприятия первичной медико-санитарной помощи, принципы оказания специализированной хирургической помощи.

Эталоны ответов

1. Тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести. Множественные рвано-ушибленные раны головы. Сдавление головного мозга внутричерепной гематомой. Отогемоликворея.

2. Группа: нуждающийся в неотложной хирургической помощи и подлежащий первоочередной эвакуации.

3. Первичная медико-санитарная помощь – воздуховод, повязки на раны, столбнячный анатоксин, антибиотик, эвакуация авиатранспортом; специализированная медицинская помощь – контроль мероприятий на этапе первичной медико-санитарной помощи, декомпрессивная трепанация черепа.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 2.33, 2.36

Ситуационная задача № 4

Условия

В стационар доставлен пациент Н., который 1,5 часа назад был ранен осколком взорвавшегося газового баллона в грудь. Состояние тяжелое, возбужден. Вынужденное полусидящее положение. Губы цианотичны. Периодический кашель с кровохарканьем. АД - 130/70 мм рт. ст., пульс 110 уд/мин. Дыхание частое, поверхностное (боязнь вдоха). Частота дыхания 40 в мин. В правой половине груди в IV межреберье по задней подмышечной линии обнаружена рана неправильной формы, размером 0,5×0,3 см. Рана воздух не присасывает, кровотечения из раны нет. Имеется выраженная подкожная эмфизема правой половины груди. Дыхание справа не выслушивается. Перкуторно справа – коробочный звук, выявлено смещение органов средостения влево.

Задания

1. Сформулируйте диагноз.
2. Примите решение по медицинской сортировке раненого на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи.
3. Перечислите необходимые мероприятия первичной медико-санитарной помощи, принципы оказания специализированной хирургической помощи.

Эталоны ответов

1. Тяжелое осколочное слепое проникающее ранение груди справа с повреждением правого легкого. Напряженный правосторонний пневмоторакс. Острая дыхательная недостаточность 3 степени.
2. Группа: нуждающийся в неотложных мероприятиях первичной медико-санитарной помощи в перевязочной.
4. Первичная медико-санитарная помощь – дренирование во 2-ом межреберье справа, повязки на рану, столбнячный анатоксин, антибиотик, ингаляция кислородом, инфузии в/в; специализированная медицинская помощь - контроль мероприятий на этапе первичной медико-санитарной помощи, первичная хирургическая обработка раны, при необходимости редренирование.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 2.33, 2.36

Ситуационная задача № 5

Условия

В стационар доставлен пациент Н., 32 лет, который 30 минут назад был ранен осколком в правую половину груди во время террористического акта. Состояние тяжелое, возбужден. Раненый беспокоен. Губы цианотичны. Вынужденное полусидящее положение. Повязку на груди удерживает руками. Бледен. АД – 120/70 мм рт. ст. Пульс – 110 уд/мин. Дыхание частое, поверхностное (боязнь вдоха). Частота дыхания 40 в минуту. Кашель с кровью. Правая половина груди отстает при дыхании. Под промокшей кровью повязкой из ППИ обнаружена рана с неровными краями, размером 1,5×0,8 см. которая при вдохе присасывает воздух. Дыхание справа резко ослаблено. Над всей правой половиной груди определяется коробочный звук.

Задания

1. Сформулируйте диагноз.

2. Примите решение по медицинской сортировке раненого на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи.
3. Перечислите необходимые мероприятия первичной медико-санитарной помощи, принципы оказания специализированной хирургической помощи.

Эталоны ответов

1. Тяжелое осколочное слепое проникающее ранение груди справа с повреждением правого легкого. Открытый правосторонний пневмоторакс. Продолжающееся внутриплевральное и наружное кровотечение. Острая дыхательная недостаточность 3 степени.
2. Группа: нуждающийся в неотложных мероприятиях первичной медико-санитарной помощи в перевязочной.
3. Первичная медико-санитарная помощь – дренирование во 2-ом межреберье справа, повязки на рану, столбнячный анатоксин, антибиотик, ингаляция кислородом, инфузии в/в; специализированная медицинская помощь - контроль мероприятий на этапе первичной медико-санитарной помощи, дренаж в 7-ом межреберье справа, контроль кровотечения, торакотомия при продолжающемся кровотечении, первичная хирургическая обработка раны, при необходимости редренирование.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 2.33, 2.36

Ситуационная задача № 6

Условия

В стационар доставлена пациентка Н., 53 лет, которая 1 час назад была извлечена из-под обломков дома через 20 мин после обрушения. Возбуждена. Частота дыхания 32 в минуту. Кожа верхней половины груди с уровня сосков, шеи, лица синюшно-багрового цвета с множественными мелкоточечными кровоизлияниями. В области глаз видны субконъюнктивальные кровоизлияния. Кровоизлияние на коже шеи под воротником рубашки отсутствуют. АД – 140/85 мм рт. ст. Пульс 110 уд/мин. Определяются резкая боль, крепитация и подвижность костных отломков при пальпации 2-6-го ребер справа и 3-8-го ребер слева по передней подмышечной линиям. Дыхание ослаблено, выслушивается с обеих сторон. Изменений перкуторного звука не обнаружено.

Задания

1. Сформулируйте диагноз.
2. Примите решение по медицинской сортировке раненого на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи.
3. Перечислите необходимые мероприятия первичной медико-санитарной помощи, принципы оказания специализированной хирургической помощи.

Эталоны ответов

1. Тяжелая закрытая травма груди с множественными двухсторонними переломами ребер. Травматическая асфиксия. ОДН 2 степени.
2. Группа: нуждающийся в первичной медико-санитарной помощи в порядке очереди.
3. Первичная медико-санитарная помощь – паравертебральные блокады, ингаляция кислородом, инфузии в/в; специализированная медицинская помощь - контроль мероприятий на этапе первичной медико-санитарной помощи, при необходимости торакоскопия и фиксация переломов.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 2.33, 2.36

Ситуационная задача № 7

Условия

В стационар доставлен пациент Н., 31 года, который 2 часа назад был ранен осколком в живот во время взрыва бытового газового баллона. Состояние удовлетворительное. Передвигается самостоятельно. Жалобы на незначительную боль в области раны живота.

Кожный покровов обычного цвета. Пульс 88 уд/мин. АД – 120/70 мм рт. ст. Язык влажный. Живот участвует в дыхании, незначительно напряжен и болезненен. В правой подвздошной области имеется рана с неровными краями размером 3×8 см с незначительным кровотечением. В глубине раны виден неповрежденный апоневроз. Симптомы раздражения брюшины сомнительные. Шумы кишечной перистальтики выслушиваются.

Задания

1. Сформулируйте диагноз.
2. Примите решение по медицинской сортировке раненого на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи.
3. Перечислите необходимые мероприятия первичной медико-санитарной помощи, принципы оказания специализированной хирургической помощи.

Эталоны ответов

1. Осколочное слепое непроникающее ранение живота с повреждением мягких тканей передней брюшной стенки.
2. Группа: легкораненые.
3. Первичная медико-санитарная помощь – повязки на рану, столбнячный анатоксин, антибиотик; специализированная медицинская помощь - контроль мероприятий на этапе первичной медико-санитарной помощи, первичная хирургическая обработка раны.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 2.33, 2.36

Ситуационная задача № 8

Условия

В стационар доставлен пациент Н., 28 лет, который 8 часов назад был извлечен из-под обломков разрушенного дома. Состояние тяжелое, бледен. Жалуется на острые боли в животе, слабость, выраженную жажду и сухость во рту. АД – 90/50 мм рт. ст., пульс 110 уд/мин. На коже области таза множественные ссадины и подкожные кровоизлияния. При нагрузке на крылья подвздошных костей определяется резкая болезненность. Патологической подвижности костей таза не обнаружено. Живот напряжен, в дыхании не участвует, шумы кишечной перистальтики ослаблены, определяется притупление перкуторного звука в отлогих местах живота. Симптомы раздражения брюшины положительные.

Задания

1. Сформулируйте диагноз.
2. Примите решение по медицинской сортировке раненого на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи.
3. Перечислите необходимые мероприятия первичной медико-санитарной помощи, принципы оказания специализированной хирургической помощи.

Эталоны ответов

1. Тяжелая сочетанная травма живота и таза. Закрытая травма живота с повреждением внутренних органов. Продолжающееся внутрибрюшное кровотечение. Закрытая травма таза с ушибом мягких тканей. Острая кровопотеря. Травматический шок 2 степени.
2. Группа: нуждающийся в неотложных мероприятиях первичной медико-санитарной помощи в противошоковой и экстренной эвакуации.
3. Первичная медико-санитарная помощь – повязки на рану, столбнячный анатоксин, антибиотик, ингаляция кислородом, инфузии в/в; специализированная медицинская помощь - контроль мероприятий на этапе первичной медико-санитарной помощи, лапаротомия, остановка внутрибрюшного кровотечения, первичная хирургическая обработка раны, операции на органах живота.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 2.33, 2.36

Ситуационная задача № 9

Условия

В стационар доставлен пациент N., 49 лет, который 4 часа назад был сдвинут двумя машинами. Состояние тяжелое, бледен. Жалуется на боли в области таза, позывы на мочеиспускание. АД – 95/50 мм рт. ст., пульс 108 уд/мин. Живот мягкий, активен в дыхании, шумы кишечной перистальтики отчетливые, симптомы раздражения брюшины отрицательные. В области лонного сочленения и правой половины таза множественные ссадины и кровоподтеки. При нагрузке на крылья подвздошных костей определяется резкая болезненность. Патологической подвижности костей таза не выявлено. Перкуторно мочевого пузыря над лобком не определяется.

Задания

1. Сформулируйте диагноз.
2. Примите решение по медицинской сортировке раненого на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи
3. Перечислите необходимые мероприятия первичной медико-санитарной помощи, принципы оказания специализированной хирургической помощи.

Эталоны ответов

1. Тяжелая закрытая травма таза с переломом костей и повреждением внутренних органов. Продолжающееся внутритазовое кровотечение. Острая кровопотеря. Травматический шок 1 степени.
2. Группа: нуждающийся в неотложных мероприятиях первичной медико-санитарной помощи в противошоковой палате и экстренной эвакуации.
3. Первичная медико-санитарная помощь – инфузии в/в, тазовая повязка; специализированная медицинская помощь - контроль мероприятий на этапе первичной медико-санитарной помощи, остановка внутритазового кровотечения аппаратом комплекта сочетанной травмы, внебрюшинная тампонадой таза, остеосинтез костей таза.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 2.33, 2.36

Ситуационная задача № 10

Условия

При выполнении операции хирург использует аподактильный метод техники хирургического вмешательства.

Задания

1. Объясните сущность этого метода.
2. Какие преимущества и недостатки имеет аподактильный метод?

Эталоны ответов

1. Аподактильный метод - выполнение большинства манипуляций в ране инструментами без прикосновения к объекту операции руками.
2. Преимущества: повышение асептичности, использование таких приемов при микрохирургических операциях, а также в глубине небольших ран (при операциях на открытых полостях сердца, при доступах к глубоко расположенным структурам головного мозга).

Недостаток: технические трудности операции.

Коды результатов обучения: 2.33, 2.310, 2.310

Ситуационная задача № 11

Условия

В основу операций при злокачественных опухолях положен абластический принцип.

Задания

1. Объясните сущность этого принципа.
2. Какие способы разъединения тканей в большей степени удовлетворяют требованиям абластичности операции?

Эталоны ответов

1. Абластичность операции - это комплекс мер по профилактике диссеминации опухолевых клеток в процессе операции. Он включает удаление органа, пораженного опухолью, с регионарными лимфоузлами.

2. Для достижения абластичности применяют разъединение органов электроножом, лазерным и плазменным скальпелем (обеспечивают также гемостаз и частичную асептичность), производят частую смену перчаток, хирургических инструментов, тампонов, предварительную перевязку кровеносных сосудов на протяжении, минимально травмируют опухоль и т. д.

Коды результатов обучения: 2.33, 2.310, 2.y10

Ситуационная задача № 12

Условия

Для наложения хирургических швов применяют режущие (трехгранные) и колющие (круглые) иглы.

1. Объясните различие в формировании лигатурного канала этими хирургическими иглами.

2. Укажите назначение двугранной посадочной площадки у режущей иглы.

Эталоны ответов

1. Лигатурный канал при использовании трехгранной (режущей) иглы образуется разрезанием слоя (перед наложением кожного шва кожу обрабатывают спиртовой йодной настойкой). Режущая часть этой иглы шире ушка. При применении круглой (колющей) иглы лигатурный канал формируется прокалыванием слоя. Режущая игла состоит из трех частей: ушка, примыкающей к ушку двугранной посадочной площадки для иглодержателя и режущей части.

2. Наличие двугранной посадочной площадки исключает вращение иглы в клюве иглодержателя по оси.

Коды результатов обучения: 2.33, 2.310, 2.y10

Ситуационная задача № 13

Условия

Хирург выполняет один из этапов операции при раке молочной железы - иссекает клетчатку и лимфатические узлы подмышечной области.

Задания

Укажите группы глубоких лимфатических сосудов этой области и их локализацию.

Эталоны ответов

Латеральная группа лимфоузлов находится на латеральной стенке подмышечной полости медиальнее сосудисто-нервного пучка; центральная - в центре основания подмышечной полости, по ходу подмышечной вены; медиальная - на передней зубчатой мышце по ходу латеральных грудных артерии и вены; задняя - по ходу подлопаточных артерии и вены; верхушечная - в ключично-грудном треугольнике по ходу подмышечной вены.

Коды результатов обучения: 2.33, 2.310, 2.y10

Ситуационная задача № 14

Условия

Хирург выполняет оперативный доступ к подмышечной артерии в грудном треугольнике.

Задания

Укажите, какие компоненты сосудисто-нервного пучка, прилежащие к подмышечной артерии, должны быть смещены в медиальную и латеральную стороны?

Эталоны ответов

Оперативный доступ к подмышечной артерии в грудном треугольнике предполагает разрез, который позволяет подойти к сосудисто-нервному пучку, не повредив соседние структуры.

Грудной треугольник соответствует проекции малой грудной мышцы. Чтобы обнажить артерию, хирург поэтапно рассекает кожу, подкожную клетчатку и фасции, пока не выйдет к самому пучку. Ключевой момент: подмышечная артерия в этом треугольнике лежит не изолированно - рядом находятся другие важные элементы, и их нужно аккуратно отвести в стороны, чтобы получить к сосуду доступ. В медиальную сторону (кнутри) смещают подмышечную вену. В грудном треугольнике она располагается медиальнее (поверхностнее) по отношению к подмышечной артерии. Иногда вместе с веной аккуратно отодвигают и прилежащие к ней лимфатические узлы. В латеральную сторону (кнаружи) смещают пучки плечевого сплетения. В этом отделе они прилежат к артерии с латеральной стороны.

Небольшой мнемонический приём, чтобы запомнить последовательность элементов в пучке (если смотреть от медиальной стороны к латеральной): Вена - Артерия - Плечевое сплетение (сокращённо «ВАПлекс»). Это помогает хирургу не запутаться при выделении сосуда. При смещении компонентов хирург действует очень осторожно, используя тупые инструменты (например, желобоватый зонд), чтобы не травмировать нервы или стенки сосудов. Цель — выделить артерию, отведя в стороны всё, что её окружает, но сохранив целостность остальных структур.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.311, 2.33, 2.36

Ситуационная задача № 15

Условия

В отделение гнойной хирургии поступил больной С., 62 лет. Диагноз: «Флегмона подмышечной области».

Задания

Укажите области, в которые возможно распространение гнойных затеков.

Эталоны ответов

При флегмоне подмышечной области гнойные затеки могут быть в латеральном треугольнике шеи (через щель между I ребром и подключичной мышцей по ходу подмышечных сосудов и плечевого нервного сплетения.), поддельтовидном клетчаточном пространстве (через четырёхстороннее отверстие), лопаточной области (через трёхстороннее отверстие, по ходу артерии, огибающей лопатку), плечевой области (по ходу основного сосудисто-нервного пучка), подключичной области (также по ходу основного сосудисто-нервного пучка), субпекторальном пространстве (поверхностное и глубокое - по межфасциальной щели и по ходу паравазальной клетчатки, окружающей латеральную грудную артерию и вену), предлопаточном клетчаточном пространстве (по ходу подлопаточной артерии и нерва), подкожной клетчатки подмышечной области и внутренней поверхности плеча (через слабо развитую в центре собственную подмышечную фасцию).

Некоторые пути распространения:

- по ходу сосудисто-нервных пучков (например, по ходу подлопаточной артерии — в область лопатки, по ходу латеральной грудной артерии — в субпекторальное пространство);
- через естественные отверстия и щели в фасциальных футлярах (четырёхстороннее отверстие — в поддельтовидное пространство, трёхстороннее отверстие — в лопаточную клетчатку);
- путём расплавления фасций в наиболее податливых местах (например, у нижнего края большой грудной мышцы).

В запущенных случаях гной может проникнуть через межрёберные промежутки в плевральную полость или между волокнами большой грудной мышцы под кожу. Распространение гнойных затеков зависит от анатомических особенностей, расположения фасций и клетчаточных пространств в области плечевого пояса и грудной стенки.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 2.33, 2.36

Ситуационная задача № 16

Условия

При операции под эндотрахеальным наркозом правое плечо больного продолжительное время опиралось на край операционного стола. В послеоперационном периоде у него отмечено ограничение разгибания большого и указательного пальцев кисти.

Задания

Объясните причину этого осложнения.

Эталоны ответов

Ограничение разгибания большого и указательного пальцев кисти после операции по поводу флегмоны подмышечной области чаще всего связано с сдавлением лучевого нерва в области плечемышечного канала. Лучевой нерв проходит в плечемышечном канале на задней поверхности плеча. Его сдавление (например, из-за отёка тканей после операции, неправильного положения руки пациента во время вмешательства или гематомы) приводит к нарушению иннервации мышц заднего мышечно-фасциального ложа предплечья. В частности, страдают длинный разгибатель большого пальца кисти и разгибатель указательного пальца. Это и вызывает слабость при разгибании указанных пальцев. Таким образом, ограничение движений — это следствие нарушения проводимости по лучевому нерву, что требует своевременной диагностики и коррекции (например, с помощью неврологического осмотра, УЗИ нерва или других методов визуализации).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 17

Условия

Больному, N., 72 лет, с целью внутривенной инфузии предполагается венепункция в передней локтевой области.

Задания

1. Объясните, какая вена чаще является объектом для чрескожной пункции? Почему?
2. Какой прием следует применить для контурирования вен передней локтевой области?

Эталоны ответов

1. Промежуточная вена локтя. Ее не сопровождают кожные нервы, она является анастомозом медиальной и латеральной подкожных вен руки.

2. Наложение жгута на плечо. Жгут накладывают в верхней трети плеча (есть рекомендации наложения жгута в нижней трети). Важно подложить под жгут матерчатую подкладку (например, полотенце или одежду пациента), чтобы избежать травмирования кожи. Жгут нельзя накладывать в средней трети плеча — это может привести к сдавлению лучевого нерва между трёхглавой мышцей и плечевой костью. Жгут затягивают так, чтобы не исчез пульс на лучевой артерии. Если затянуть слишком сильно, пережмётся артерия, и наполнение вен кровью ухудшится.

После наложения жгута и выполнения дополнительных приёмов вены становятся более заметными, их можно пропальпировать и выбрать наиболее подходящую для пункции (например, промежуточную вену локтя, которая часто служит анастомозом между медиальной и латеральной подкожными венами руки).

Дополнительные приёмы для улучшения контурирования:

- А) Попросить пациента «поработать кулаком» — несколько раз интенсивно согнуть и разогнуть пальцы руки. Это способствует лучшему наполнению вен кровью.
- Б) Нагнетающие движения по передней поверхности предплечья — снизу вверх. Такие движения помогают увеличить объём крови в поверхностных венах локтевой ямки.
- В) Максимальное разгибание верхней конечности в локтевом суставе (под заднюю часть локтя можно подложить мешочек с песком или другое подручное средство).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 18

Условия

В хирургическое отделение поступил пациент Н. с глубокой резаной раной переднелатерального отдела локтевой ямки. Рана, длиной 2 см, расположена на уровне локтевого сгиба, латерально от сухожилия двуглавой мышцы плеча.

Задания

Укажите, какие мышцы могли быть повреждены, функцию какого нерва следует проверить для постановки диагноза?

Эталоны ответов

Медиально-плечевая мышца (находится в переднемедиальной части локтевой ямки, поэтому её повреждение вероятно при ранении в указанном переднелатеральном отделе), латерально от неё - плечелучевая мышца и длинный лучевой разгибатель запястья (эти мышцы формируют латеральную группу мышц предплечья).

Нерв, функцию которого следует проверить для постановки диагноза: лучевой нерв, его поверхностная и глубокая ветви. Он проходит в задней области плеча и предплечья, но в переднелатеральном отделе локтевой ямки он может быть затронут при глубоком ранении. Его ветви (поверхностная и глубокая) иннервируют мышцы этой зоны.

Для диагностики повреждения нерва необходимо провести неврологическое обследование, включая проверку силы мышц-разгибателей предплечья и кисти, а также чувствительности в зонах, иннервируемых ветвями лучевого нерва

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36

Ситуационная задача № 19

Условия

У больного Н., 49 лет, выявлено гнойное воспаление локтевого сустава. При обследовании, наряду с другими симптомами, обнаружены выпячивания по бокам локтевого отростка.

Задания

Дайте топографо-анатомическое обоснование этого симптома.

Эталоны ответов

Задневерхний отдел капсулы локтевого сустава латерально от локтевого отростка и сухожилия трехглавой мышцы не покрыт мышцами (слои: кожа, подкожная клетчатка с поверхностной фасцией, собственная фасция, капсула сустава), вследствие чего при скоплении гнойного экссудата в суставе образуются выпячивания по бокам локтевого отростка.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 20

Условия

У тучной больной 68 лет, выполняют оперативный доступ к седалищному нерву в задней области бедра.

Задания

1. Можно ли использовать в качестве внешнего ориентира при разрезе кожи ягодичную складку? Почему?

2. Как образуется эта складка?

Эталоны ответов

1. Да, ягодичную складку можно использовать в качестве внешнего ориентира при разрезе кожи для доступа к седалищному нерву в задней области бедра. Это обосновано анатомической проекцией: седалищный нерв в этой зоне располагается относительно поверхностно и прикрыт только собственной фасцией, что делает его более доступным для обнажения. Разрез кожи часто выполняют в области пересечения ягодичной складки с проекционной линией ствола седалищного нерва. Эта линия проходит от середины расстояния между седалищным бугром и большим вертелом бедренной кости к середине подколенной ямки. Иногда происходит смещение ягодичной складки книзу и тогда складка не соответствует нижнему краю большой ягодичной мышцы (пересекает его под острым углом).

2. Ягодичная складка образуется в результате слияния и продолжения вниз сухожилий мышц задней поверхности бедра: полусухожильной, полуперепончатой и двуглавой мышцы бедра. Она служит внешним ориентиром при хирургических вмешательствах в этой области.

Следует учитывать, что при выполнении оперативного доступа необходимо строго соблюдать последовательную визуализацию как наружных, так и внутренних анатомических ориентиров для безопасного и эффективного обнажения целевого анатомического объекта.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.37, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 21

Условия

На прием к хирургу обратилась пациентка N. 48 лет. Диагноз: «Правосторонняя бедренная грыжа». Из анамнеза выявлены патогенетические факторы грыжи: повышенное внутрибрюшное давление, дегенеративные изменения слоев брюшной стенки и таза (кашель вследствие бронхоэктатической болезни, трое родов).

Задания

Назовите анатомические предпосылки возникновения бедренной грыжи.

Эталоны ответов

- 1) бедренное кольцо занимает медиальную треть сосудистой лакуны. Оно выполнено жировой клетчаткой и лимфатическим узлом Розенмюллера-Н. И.Пирогова;
- 2) бедренная перегородка, отделяющая полость живота от бедра (часть поперечной фасции) имеет отверстия, пропускающие лимфатические сосуды;
- 3) со стороны париетальной брюшины бедренному кольцу соответствует бедренная ямка;
- 4) книзу от паховой связки имеется подкожная щель, ограниченная серповидным краем широкой фасции бедра.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 22

Условия

На поликлинический прием к хирургу обратился N., 41 года, по профессии паркетчик. После обследования пациента хирург поставил диагноз: «Хронический бурсит правой подкожной синовиальной преднадколенниковой сумки».

Задания

1. Объясните причину возникновения бурсита у пациента N.
2. Какие сумки, кроме этой, относятся к преднадколенниковым?

Эталоны ответов

1. Хроническое воспаление синовиальных (слизистых) сумок является следствием хронической механической травмы (длительное механическое раздражение).
2. К преднадколенниковым сумкам, кроме подкожной, относятся: подфасциальная

преднадколенниковая сумка (расположена под собственной фасцией бедра спереди надколенника) и подсухожильная преднадколенниковая сумка (находится между надколенником и покрывающим его продолжением поверхностных пучков сухожилия четырёхглавой мышцы бедра).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 23

Условия

У больного гнойный гонит. Вскрытие и дренирование переднего отдела полости сустава осуществлено парапателлярными разрезами. С целью дренирования заднего отдела полости сустава делают контрапертуру по медиальному краю подколенной ямки. Для этого через медиальный парапателлярный разрез проводят корнцанг в заднем направлении. Концом его вблизи сухожилия полу сухожильной мышцы образуют выпячивание мягких тканей и над ним делают разрез. По латеральному краю подколенной ямки артротомию делать не рекомендуется (И. А. Мовшович, 1994).

Задания

Объясните, почему?

Эталоны ответов

Во избежание повреждения общего малоберцового нерва, прилегающего к медиальной поверхности сухожилия двуглавой мышцы бедра (верхняя латеральная стенка подколенной ямки). В случае крайней необходимости задней латеральной контрапертуры, с целью исключения повреждения этого нерва также образуют выпячивание мягких тканей, которое обеспечивает смещение в сторону нерва и является ориентиром для выполнения разреза.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33.

Ситуационная задача № 24

Условия

Больному планируется бедренно-заднебольшеберцовое шунтирование.

Задания

1. В каком канале задней области голени располагается задняя большеберцовая артерия?
2. Назовите мышцы, составляющие стенки этого канала.
3. Какова синтопия элементов сосудисто-нервного пучка и проекция задней большеберцовой артерии?
4. Суть операции?

Эталоны ответов

1. Задняя большеберцовая артерия, две сопровождающие её вены и большеберцовый нерв располагаются в голено-подколенном канале (нерв - латерально, артерия - медиально).
2. Передней стенкой этого канала является задняя большеберцовая мышца, медиальной - длинный сгибатель пальцев, латеральной - длинный сгибатель большого пальца, задней - камбаловидная мышца.
3. Проекция задней большеберцовой артерии соответствует линии, соединяющей точку на 1 см кзади от медиального края большеберцовой кости (сверху) и середину расстояния между пяточным (ахилловым) сухожилием и медиальной лодыжкой (снизу).
4. Суть вмешательства в том, чтобы подшить один конец шунта к общей бедренной артерии выше места закупорки, а другой — к проходимой задней большеберцовой артерии (одной из артерий голени) ниже поражения. Для шунта чаще всего используют собственную вену пациента — большую подкожную вену. При этом часто применяют технику *in situ*: вену не извлекают из её ложа, а лишь разрушают в ней клапаны, чтобы кровь текла в нужном направлении (к периферии, а не к сердцу). Если большая подкожная вена по каким-то

причинам не подходит, шунт могут сделать из других вен (на ноге или руке). Синтетические протезы применяют реже из-за более высокого риска последующего тромбоза. После запуска кровотока обязательно проверяют проходимость шунта с помощью УЗИ или ангиографии. Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33.

Ситуационная задача № 25

Условия

Больному N., 53 лет, показана целиакография.

Задания

1. Объясните, что представляет собой этот метод исследования?
2. Каким образом производят целиакографию?

Эталоны ответов

1. Целиакография, вид селективной ангиографии (синоним — ангиография чревного ствола), - рентгеноконтрастное исследование бассейна чревного ствола посредством пункции и катетеризации бедренной артерии по способу Сельдингера.
2. Обычно пунктируют бедренную артерию, через которую проводят катетер и устанавливают его в чревном стволе. Затем внутриаартериально вводят рентгеноконтрастное вещество и выполняют серию ангиограмм, которые позволяют изучить артериальную, капиллярную (паренхиматозную) и венозную фазы кровотока в сосудах. При необходимости возможно введение контраста в любую из ветвей чревного ствола (суперселективная ангиография).

Целиакография позволяет:

- А) оценить архитектуру сосудов;
- Б) выявить патологические изменения: опухоли, травмы, воспалительно-деструктивные поражения;
- В) определить состояние после оперативных вмешательств на органах брюшной полости.

Метод применяется для диагностики стенозов и аневризм чревного ствола, желудочных кровотечений, а также при подозрении на злокачественные опухоли желудка, печени, поджелудочной железы, селезёнки, желчного пузыря и его протоков, большого и малого сальника. Во время целиакографии могут проводиться лечебные мероприятия, например, введение ингибиторов протеолитических ферментов при остром панкреатите.

К противопоказаниям относятся:

- А) тяжёлое общее состояние пациента;
- Б) психические расстройства;
- В) значительные нарушения функций сердца, печени, почек;
- Г) непереносимость рентгеноконтрастных препаратов.

Среди возможных осложнений — аллергические реакции на контрастное вещество, нарушения сердечного ритма, кровотечение из сосуда после пункции, гематомы, спазм и тромбоз сосудов.

В настоящее время целиакография применяется реже из-за своей травматичности и меньшей разрешающей способности по сравнению с современными методами визуализации (УЗИ, КТ, МРТ). Однако в ряде случаев она сохраняет важное диагностическое и прогностическое значение. Интерпретация ангиограмм требует специальных навыков, так как существует множество вариантов артериального кровоснабжения органов.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 26

Условия

Хирург накладывает циркулярный сосудистый шов по способу Карреля.

Задания

Объясните, с какой целью предварительно иссекают наружную оболочку (адвентицию), освобождая от нее 2-3 мм концов артерии?

Эталоны ответов

Предварительное иссечение наружной оболочки (адвентиции) на протяжении 2–3 мм концов артерии при наложении циркулярного сосудистого шва по способу Карреля исключает вворачивание адвентиции в просвет сосуда при прошивании его стенки. Это обеспечивает атромбогенность сосудистого шва. При хирургическом или травматическом рассечении стенки сосуда мышечно-интимальный слой сокращается сильнее, чем наружная адвентициальная оболочка, из-за чего над краем рассечённой стенки образуется её избыток. Если этот избыток не иссечь, при наложении швов он может вворачиваться в просвет, что повышает риск стеноза (сужения) сосуда. После иссечения адвентиции шов накладывают через все слои стенки сосуда, а сшиваемые концы должны соприкасаться внутренними оболочками (интимой). Иглу вкалывают примерно в 1 мм от края сосуда, с интервалом между стежками 1–2 мм.

Ключевая особенность способа это использование трёх швов-держалок, которые накладываются через все слои стенки сосуда на равном расстоянии друг от друга (под углом 120°). Это временно деформирует просвет сосуда в треугольную форму, что позволяет равномерно накладывать непрерывный обвивной шов и исключает захват иглой противоположной стенки.

Всё это позволяет:

А) избежать «интерпозиции» — попадания адвентиции в просвет анастомоза. Когда хирург сближает концы артерии для сшивания, рыхлая адвентиция может сместиться и буквально «застрять» между сшиваемыми краями или обвиться вокруг нитей. Это нарушает плотное сопоставление слоёв стенки сосуда. В результате шов получается менее герметичным, а в месте такого «зазора» легко откладывается фибрин и формируется тромб, что грозит сужением просвета (стенозом) или полной облитерацией (заращением) сосуда. Иссекая небольшой участок, хирург устраняет эту проблему и обеспечивает ровное, плотное соединение слоёв: интима к интима, медиа к медиа.

Б) более простое сопоставление слоёв стенки. После удаления части адвентиции торцы артерии становятся более «аккуратными». Это упрощает задачу хирурга: ему легче точно совместить все три слоя стенки (интиму, медию, адвентицию) при наложении швов-держалок и последующего обвивного шва. Если адвентиция нависает, добиться идеального сопоставления сложнее, повышается риск технических ошибок.

В) снижается риск вторичного сужения. Плотное, равномерное сопоставление слоёв после иссечения адвентиции способствует более физиологичному заживлению анастомоза. Это помогает предотвратить компенсаторную гиперплазию интимы (разрастание внутреннего слоя) в зоне шва в послеоперационном периоде, которая тоже может привести к стенозу.

Таким образом, этот этап — не просто формальность, а важная техническая деталь, которая напрямую влияет на успех всей операции: обеспечивает герметичность, снижает риск тромбообразования и помогает сохранить нормальный кровоток в восстановленном сосуде.

Модификация А.И. Морозовой (1909). Эта версия считается одной из наиболее удачных и практичных, она упростила технику Карреля. Основные отличия: вместо трёх швов-держалок применяются две, роль третьей лигатуры, которая используется для начала шва, выполняет основная нить. Сначала накладывается обвивной непрерывный шов на одну (переднюю) стенку сосуда. Затем зажимы вместе с сосудом поворачиваются на 180°, и сшивается другая полуокружность.

В настоящее время метод Карреля в чистом виде применяется преимущественно для сшивания сосудов малого диаметра. Для работы с сосудами сверхмалого диаметра (менее 1 мм) были разработаны специальные приёмы, например, предварительное введение в просвет сосуда масляного контрастного препарата (липиодол) для расправления стенок и предотвращения их слипания.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 27

Условия

Во время операции при кожном панариции ногтевой фаланги большого пальца после удаления отслоившегося эпидермиса обнаружен свищ в подкожной клетчатке. При надавливании в зоне свища появился гной.

Задания

Какова тактика хирурга в этой ситуации?

Эталоны ответов

Вскрытие и дренирование гнойника. Хирург рассекает свищевой ход, чтобы обеспечить отток гноя, и устанавливает дренажные трубки для постоянного промывания полости антисептиками и оттока содержимого. Это позволяет быстро очистить очаг инфекции.

Радикальное удаление свищевого хода. После стихания острого воспаления (обычно через несколько дней, после курса антибиотиков) проводят окончательное лечение - иссечение свища. Важно удалить патологический канал вместе со всеми разветвлениями и внутренними карманами, где может скапливаться гной.

Удаление источника инфекции.

Послеоперационное лечение. Рану продолжают промывать антисептиками, устанавливают дренажи. Назначают курс антибиотиков для борьбы с инфекцией, а также противовоспалительные и общеукрепляющие средства. Перевязки проводят ежедневно до прекращения выделения гноя.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 28

Условия

Пострадавшему Н., 37 лет, выполняют фасциопластическую ампутацию голени на уровне средней трети.

Задания

1. Какой лоскут мягких тканей должен быть длиннее?
2. Какие мягкие ткани входят в состав переднего и заднего лоскута?
3. В какой последовательности укрывают опилы больше- и малоберцовой костей этими лоскутами?

Эталоны ответов

1. При фасциопластической ампутации голени на уровне средней трети передний лоскут мягких тканей должен быть длиннее заднего. Общая длина обоих лоскутов в сумме составляет диаметр конечности на уровне распила кости ($\frac{1}{3}$ длины окружности голени), с добавлением 2–4 см на сократимость кожи.

2. Передний лоскут состоит из кожи, подкожной клетчатки с поверхностной фасцией и собственной фасции, задний - формируется преимущественно из собственной фасции голени (апоневроза). В некоторых модификациях в состав заднего лоскута может включаться общее сухожилие икроножной мышцы.

3. Задний лоскут подшивают к основанию отведенного кверху переднего лоскута (соединяя собственную фасцию задней области голени с собственной фасцией передней области), затем укладывают передний лоскут и накладывают кожные швы.

Дополнительные детали техники:

А) граница между лоскутами снаружи проходит вдоль малоберцовой кости, а изнутри — несколько кзади от внутреннего края большеберцовой кости;

Б) после укрытия опилов кости и обработки мягких тканей в углы раны помещают резиновые выпускники, а конечность фиксируют гипсовой лонгетой.

Такой подход позволяет сформировать культю правильной формы, облегчить последующее протезирование и снизить риск осложнений, например, остеомиелита.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 29

Условия

У больного Н., 26 лет, вследствие инфицированной раны мягких тканей области сосцевидного отростка возник тромбоз поперечного и сигмовидного синусов.

Задания

Объясните причинную взаимосвязь этих патологических процессов.

Эталоны ответов

Причинно-следственная связь между инфицированной раной мягких тканей области сосцевидного отростка и тромбозом поперечного и сигмовидного синусов головного мозга выглядит следующим образом:

А) Распространение инфекции. Инфицированная рана становится входными воротами для патогенных микроорганизмов. Воспалительный процесс в этой области (например, мастоидит — гнойное воспаление тканей сосцевидного отростка) приводит к разрушению костной ткани и образованию гнойного очага.

Б) Прямое распространение воспаления на стенку синуса. Сосцевидный отросток граничит с сигмовидным синусом. При прогрессировании воспаления происходит контакт гнойного очага с наружной стенкой синуса, что вызывает её воспаление — перисинуозный абсцесс. Затем может развиться поражение самого синуса: сначала возникает перифлебит, затем эндофлебит, формируется пристеночный тромб, который впоследствии может стать обтурирующим.

В) Распространение инфекции гематогенным путём. Микробы и их токсины могут проникать в просвет синуса, а также распространяться через эмиссарные вены, которые соединяют поверхностные вены головы и шеи с венозными синусами черепа.

Г) Образование тромба. Повреждение эндотелия сосудистой стенки, изменение биохимического состава крови под действием микробов или их токсинов в сочетании с замедлением тока крови способствуют формированию сначала пристеночного, а затем обтурирующего тромба. Образование тромба в данном случае рассматривается как защитная реакция на проникновение инфекции, но одновременно это опасное осложнение тромбофлебита.

Д) Распространение тромбоза на поперечный синус. Тромбоз сигмовидного синуса может ретроградно распространяться на поперечный синус вплоть до их слияния, а также на другие венозные структуры (например, на яремную вену).

Таким образом, инфицированная рана в области сосцевидного отростка создаёт условия для распространения инфекции на прилегающие структуры, включая стенку синуса, что в итоге приводит к тромбозу поперечного и сигмовидного синусов.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 30

Условия

Пострадавшему Н., 35 лет, производят хирургическую обработку резаной раны щечной области.

Задания

- 1.Объясните причину зияния раны, значительной кровоточивости ее краев.
- 2.Какими особенностями кровоснабжения обусловлено хорошее заживление раны?
- 3.Какой вид кожного шва показан этому пациенту?

Эталоны ответов

1. Зияние раны объясняется сократимостью слоев щечной области (в кожу вплетаются мимические мышцы).
- 2.Значительная кровоточивость краев и быстрое заживление раны связано с интенсивным кровоснабжением (большое количество сосудистых анастомозов).
3. Косметический (субэпидермальный) шов - это специальная хирургическая техника наложения шва, главная цель которой добиться максимально незаметного, тонкого рубца после заживления раны. Ключевое отличие от обычного шва в том, что игла проходит не через все слои кожи сразу, а преимущественно внутри дермы (собственно кожи), оставляя эпидермис (верхний слой) нетронутым.

Одна из самых распространенных- внутрикожный шов по Холстеду. Его техника: иглу вкалывают примерно в 1 см от края раны, проводят её внутри кожи, захватывая одинаковые по размеру участки с обоих краёв раны, постепенно стягивая края, формируют шов, концы нитей завязывают (иногда для удобства используют пуговицу или специальную стрип-наклейку).

В пластической хирургии применяют также внеэпидермальный узловый шов по Эбади - он обеспечивает идеальное сопоставление всех слоёв кожи и позволяет выравнивать уровень высот краёв раны.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.37, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 31

Условия

У больной Н., 33 лет, которая «выдавила прыщик»,вился фурункул верхней губы. Наряду с выраженной интоксикацией, резким отеком лица, отмечается покраснение и болезненность по ходу лицевой и угловой вены к медиальному краю глазной щели, при пальпации - вены плотные, перекатываются под пальцем.

Задания

- 1.Какими особенностями строения кожи определяется частота локализации фурункулов носогубного треугольника?
- 2.Какое грозное внутричерепное осложнение может развиться у этой больной? Почему?

Эталоны ответов

1. Кожа верхней губы содержит большое количество сальных желез.
- 2.При фурункуле может развиться тромбофлебит и тромбоз пещеристого синуса твердой мозговой оболочки по схеме: верхняя губная вена > лицевая вена и ее начальный отдел у медиального края глазной щели угловая вена > верхняя и нижняя глазные вены > пещеристый синус.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 32

Условия

Больной Н., 45 лет, выполняют правостороннюю паротидэктомию по поводу смешанной опухоли.

Задания

- 1.Какой нерв и его ветви должны быть выпрепарованы в процессе операции?

2. Какой метод исследования позволяет идентифицировать (отличить от рубцовых тяжей) ветви этого нерва?
3. Каким образом можно обеспечить гемостаз при выполнении паротидэктомии?

Эталоны ответов

1. Лицевой нерв - VII пара черепных нервов, который иннервирует мимические мышцы лица. В процессе операции по поводу смешанной опухоли (например, плеоморфной аденомы) необходимо выделить и сохранить его ветви. К ним относятся: височные ветви; скуловые ветви; щёчные ветви; краевая ветвь нижней челюсти; шейная ветвь.
2. Электрофизиологический метод исследования позволяет идентифицировать ветви лицевого нерва и отличить их от рубцовых тяжей. Этот метод основан на регистрации биоэлектрических потенциалов, что помогает точно определить локализацию нерва и снизить риск его повреждения.
3. Гемостаз при выполнении паротидэктомии обеспечивается комплексом мер:
 - А) Коагуляция - использование электрохирургических инструментов для остановки кровотечения из мелких сосудов.
 - Б) Клипирование - наложение металлических скобок (клипов) на кровоточащие сосуды.
 - В) Перевязка сосудов - в частности, наружной сонной артерии на протяжении в сонном треугольнике — для контроля кровотечения.
 - Г) Установка дренажей для эвакуации крови и тканевой жидкости из операционной раны, что помогает предотвратить образование серомы.
 - Д) Тщательный гемостаз - контроль за всеми источниками кровотечения на этапе ушивания раны.

Выбор метода гемостаза зависит от конкретной ситуации, характера операции и индивидуальных особенностей пациента.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 33

Условия

При ревизии раны мягких тканей теменной области обнаружен небольшой депрессионный перелом кости (отломок не связан с черепом), подтвержденный краниографией.

Задания

Как производят хирургическую обработку костной раны?

Эталоны ответов

При депрессионном переломе черепа, когда костный отломок полностью утратил связь с неповреждённым сводом, хирургическая обработка костной раны направлена на устранение сдавления головного мозга, удаление свободно лежащих отломков и создание условий для заживления. Выпиливают большой костный лоскут, в центре которого находится зона повреждения: ее обрабатывают, осуществляют ревизию раны, эпи- и субдурального пространств, а затем костный лоскут укладывают на прежнее место (принцип Де Мартеля).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 34

Условия

В отделение гнойной хирургии госпитализирован больной N., 16 лет. Вследствие перфорации стенки пищевода костью у больного имеется припухлость шеи больше с левой стороны, боли при глотании, повороте головы, температура тела 39,3°.

Задания

1. Укажите, в каком клетчаточном пространстве шеи развилась флегмона?
2. В какой области может сформироваться гнойный затек?
3. Где производят разрез для вскрытия флегмоны?

Эталоны ответов

1. У больного возникла флегмона позадиорганного (ретровисцерального) пространства (по бокам и позади пищевода).
2. При флегмоне позадиорганного (ретровисцерального) пространства гнойный затек может сформироваться в нескольких направлениях, в зависимости от путей распространения инфекции по клетчаточным пространствам шеи.

Основные области, куда может распространиться гной:

А) В переднее средостение - наиболее опасное осложнение, так как ретровисцеральное пространство непосредственно связано с передним средостением. Это может привести к развитию переднего медиастинита.

Б) В боковое клетчаточное пространство шеи - по ходу фасциальных влагалищ сосудисто-нервных пучков, которые проходят в этом регионе

В) В заднее средостение - при распространении воспаления вдоль пищевода и его фасциального футляра.

Гной может распространяться не только по естественным каналам, но и расплавлять окружающие ткани, образуя дополнительные гнойные очаги. Быстрое распространение инфекции связано с особенностями строения клетчатки шеи и наличием фасциальных футляров для сосудов и нервов.

3. Вскрытие флегмоны производят по переднему краю левой грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Ретровисцеральное пространство расположено между четвёртой (париетальной) и пятой (предпозвоночной) фасциями шеи. Доступ по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы позволяет хирургу обойти важные сосудисто-нервные структуры (сосудисто-нервный пучок), которые проходят в сонном треугольнике, и безопасно подойти к клетчатке ретровисцерального пространства.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 35

Условия

У больного Н., 47 лет, с перитонитом произведено наружное дренирование (выделение и катетеризация) грудного (лимфатического) протока.

Задания

1. Объясните цель этой операции.
2. Куда впадает грудной проток, какой разрез чаще используют для его выделения?

Эталоны ответов

1. Наружное дренирование грудного (лимфатического) протока показано с целью лимфосорбции - одного из методов детоксикации организма. Полученную лимфу пропускают через сорбент (общего или селективного действия), то есть очищают от токсинов и реинфузируют.

2. Грудной (лимфатический) проток открывается в заднюю стенку левого (62% по В. Х. Фраучи) венозного угла Н. И. Пирогова (слияние внутренней яремной и подключичной вены). Разрез производят по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы (6-8 см), начиная от грудины. Обнажают внутреннюю яремную вену, осторожно выделяя ее, и подходят к венозному углу и грудному протоку.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 36

Условия

После нижней трахеостомии у больного появились боли в области операционной раны, гиперемия кожи, болезненность, припухлость, повысилась температура тела до 39-40°.

Задания

Назовите слои клетчатки шеи, в которых может развиваться гнойный процесс, чем они ограничены, куда распространяются гнойные затеки?

Эталоны ответов

В раннем послеоперационном периоде после нижней трахеостомии может развиваться нагноение в подкожной, либо надгрудинной межапоневротической, либо претрахеальной клетчатке. Надгрудинное пространство ограничено 2-ой и 3-ей фасциями шеи, претрахеальное - париетальными и висцеральными листками 4-ой фасции шеи. Подкожная флегмона может распространиться на переднюю грудную стенку, надгрудинная межапоневротическая - в слепой мешок (Грубера) между 2-ой и 3-ей фасциями кзади от грудино-ключично-сосцевидной мышцы и в ее футляр, претрахеальная - в переднее средостение.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 37

Условия

В хирургическое отделение поступил больной N., 25 лет. Диагноз: «Флегмона надгрудинного межапоневротического пространства».

Задания

1. Укажите, чем ограничено это пространство.
2. Где может возникнуть гнойный затек?
3. Какое образование может быть повреждено при вскрытии этой флегмоны разрезом на 1 см кверху от яремной вырезки грудины?

Эталоны ответов

1. Межапоневротическое надгрудинное пространство снизу ограничено яремной вырезкой грудины, спереди - второй фасцией шеи, прикрепляющейся к передней поверхности грудины и грудино-ключичного сочленения, сзади - третьей фасцией, прикрепляющейся к задней поверхности грудины.
2. Гной из этого пространства может распространиться в слепой мешок, лежащий кзади от грудино-ключично-сосцевидной мышцы или в футляр этой мышцы.
3. Гнойную полость вскрывают дугообразным разрезом на 1 см выше яремной вырезки грудины или вертикальным разрезом по срединной линии (в этом случае может быть повреждена яремная венозная дуга).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 38

Условия

При выполнении нижней трахеостомии в момент рассечения трахеи возникло артериальное кровотечение.

Задания

1. Какие артерии могут быть повреждены при трахеостомии?
2. Укажите меры профилактики этих осложнений.

Эталоны ответов

1. При нижней трахеостомии могут быть повреждены:

Брахиоцефальный (плечеголовной) ствол — крупный сосуд, который проходит спереди от трахеи на уровне 8–11-го колец. При атипичном (нестандартном) расположении артерии риск её частичного повреждения или полного пересечения во время операции повышается.

Нижние щитовидные артерии — могут быть затронуты при манипуляциях в области перешейки щитовидной железы.

Восходящая шейная артерия — может повреждаться при доступе в претрахеальное пространство.

Левая общая сонная артерия и даже дуга аорты (у детей и женщин).

2. С целью предупреждения ранения этих артерий следует: обеспечить правильное положение больного на операционном столе (валик высотой 12-15 см под лопатки, голова запрокинута, внешние ориентиры соответствуют прямой, находящейся по срединной линии); тщательно отделить от претрахеальной клетчатки переднюю стенку трахеи (при доступе к трахее внутренним ориентиром является «белая линия» шеи); зафиксировать трахею и убедиться в отсутствии крупных кровеносных сосудов в ране.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 39

Задания

Почему осмотр и пальпацию пациентки при подозрении на рак молочной железы проводят при различных положениях туловища (вертикальное, горизонтальное, сидячее, коленно-локтевое) и верхней конечности (отведена в сторону, поднята вверх, ладонь на затылке и др.)?

Эталоны ответов

Молочная железа располагается на мышцах грудной стенки. Обеспечение различного функционального состояния мышц (сокращение, расслабление) позволяет получить большую информацию о смещаемости железы и поражении подмышечных лимфоузлов.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36.

Ситуационная задача № 40

Условия

Больному N., 68 лет, по поводу бронхогенного рака левого легкого производят пневмонэктомию.

Задания

Какие кровеносные сосуды могут быть повреждены при обработке левого главного бронха?

Эталоны ответов

При хирургической обработке (например, при пневмонэктомии — удалении всего левого лёгкого) рядом с левым главным бронхом действительно проходят крупные сосуды, которые при неосторожных манипуляциях легко травмировать.

А) Аорта (восходящая часть, дуга, грудная часть). Левый главный бронх расположен в непосредственной близости к дуге аорты и месту её перехода в нисходящую аорту. При выделении бронха есть риск случайного ранения стенки сосуда, что грозит массивным кровотечением.

Б) Лёгочный ствол (который делится на правую и левую лёгочные артерии). Этот сосуд также проходит в верхнем средостении рядом с левым главным бронхом. Его повреждение во время операции может привести к серьёзной кровопотере.

В) Бронхиальные артерии. Это сосуды, которые питают сами бронхи и лёгочную ткань. Они отходят от грудной аорты и в норме идут в толще лёгочной ткани. При манипуляциях вблизи

корня лёгкого (места, где бронх входит в лёгкое) есть риск затронуть и эти сосуды, особенно если они выражены аномально или вовлечены в патологический процесс (например, при опухоли).

Это связано с тем, что анатомически левый главный бронх «подвешен» на дуге аорты и тесно связан с корнем левого лёгкого. Сосуды средостения и элементы корня как бы «обхватывают» бронх, поэтому при его мобилизации неизбежно возникает близость к крупным сосудистым структурам.

Для снижения риска хирурги проводят тщательную предоперационную оценку: изучают КТ или МРТ грудной клетки, чтобы точно определить взаиморасположение бронха и сосудов, выявить аномалии. Во время операции хирург действует максимально аккуратно, использует специальные инструменты и при необходимости применяет ультразвуковые или лазерные технологии для точечного гемостаза.

Если в ходе операции возникает подозрение на повреждение сосуда, первоочередной задачей становится остановка кровотечения — это может потребовать срочного ушивания дефекта, перевязки сосуда или других вмешательств.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 41

Условия

При мобилизации задней стенки грудного отдела пищевода появилась желтовато-молочная жидкость.

Задания

1. Какое образование повреждено?
2. Как поступают в случае возникновения этого осложнения?

Эталоны ответов

1. Появление желтовато-молочной жидкости (лимфы) при мобилизации задней стенки грудного отдела пищевода указывает на повреждение грудного протока. Он проходит в заднем средостении, близко к пищеводу, и его случайное повреждение возможно при неосторожном выделении задней поверхности органа.

2. При повреждении этого осложнения необходимо:

А) Немедленно прекратить манипуляции в зоне повреждения. Это критически важно, чтобы избежать дальнейшей потери лимфы и инфицирования окружающих тканей.

Б) Аккуратно выделить и перевязать концы повреждённого протока. Это стандартная хирургическая тактика для устранения лимфоистечения.

В) Провести тщательную ревизию окружающих тканей для исключения других повреждений (например, мелких лимфатических сосудов или узлов).

Г) Оценить состояние средостения и плевральных полостей на предмет распространения лимфы (хилоторекс — скопление лимфы в плевральной полости) и при необходимости установить дренажи для её эвакуации.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 42

Условия

У больного Н., 27 лет, рубцовый стеноз пищевода, неподдающийся бужированию.

Задания

1. Какая восстановительная операция показана ему?
2. Какие органы могут быть использованы с этой целью?

Эталоны ответов

1. При рубцовом стенозе пищевода, который не поддаётся бужированию, показана реконструктивно-восстановительная операция. Её цель — восстановить проходимость пищевода, обеспечить адекватное питание пациента и снизить риск осложнений, включая малигнизацию (развитие рака) в зоне рубцевания.

2. Выбор конкретного вмешательства зависит от множества факторов: протяжённости и локализации стриктуры, общего состояния пациента, наличия сочетанных поражений глотки и желудка, а также от характера ранее перенесённых операций на органах брюшной полости.

Основные варианты операций:

А) Эзофагопластика желудочной трубкой. Это предпочтительный метод при возможности его выполнения. Из стенки желудка формируют трубку, которую затем проводят в область шеи и соединяют с шейным отделом пищевода (эзофагогастроанастомоз). Желудочный трансплантат имеет надёжное кровоснабжение и преимущества для пищеварения.

Б) Колоэзофагопластика (пластика толстой кишкой). Трансплантат формируют из левой половины толстой кишки с частью поперечно-ободочной кишки на питающей левой ободочной артерии. Этот вариант рассматривают при невозможности использовать желудок или при протяжённых стриктурах. Левая половина толстой кишки предпочтительнее из-за более надёжного кровоснабжения по сравнению с правой.

В) Тонкокишечная пластика. Тонкую кишку обычно не используют для первичной реконструкции искусственного пищевода. Однако в сложных случаях (например, при сочетанных поражениях пищевода и желудка) может применяться комбинированный трансплантат, сочетающий желудочную трубку и тонкокишечную вставку.

Г) Экстирпация пищевода (полное его удаление) имеет ограниченные показания и выполняется только по строгим показаниям.

Перед операцией часто выполняют гастростомию (наложение свища на желудок) для обеспечения энтерального питания, особенно если есть риск несостоятельности анастомоза или при длительном периоде невозможности питания через рот. После операции требуется длительная реабилитация с соблюдением специальной диеты и медикаментозной поддержкой для предотвращения осложнений.

Решение о необходимости и виде операции принимает консилиум врачей - хирург-гастроэнтеролог и торакальный хирург, с учётом всех индивидуальных особенностей пациента.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 43

Условия

У больного Н., 57 лет, диагностирован бронхогенный рак правого легкого.

Задания

1. Какая операция показана ему?

2. Какой оперативный доступ следует использовать?

Эталоны ответов

1. Основные варианты хирургического вмешательства:

А) Сегментэктомия (удаление одного сегмента лёгкого) - при ранних формах рака, когда возможно сохранить максимально возможный объём лёгочной ткани.

Б) Лобэктомия (удаление доли лёгкого) или билобэктомия (удаление двух долей) - при более распространённом процессе.

В) Пневмонэктомия (удаление всего лёгкого) — при центральной локализации опухоли, вовлечении в процесс главных бронхов или крупных сосудов корня лёгкого.

Г) Бронхопластическая операция (например, лобэктомия с циркулярной резекцией бронха) - при центральной локализации опухоли, которая распространяется на устья долевых или

главных бронхов, но без явной лимфогенной распространённости в пределах корня лёгкого. Такая операция позволяет сохранить часть дышащей паренхимы лёгкого без ущерба для радикальности.

Независимо от объёма удаляемой лёгочной ткани, медиастинальная лимфодиссекция (удаление клетчатки с лимфатическими узлами регионарных зон метастазирования) является обязательным этапом операции

2. Варианты доступа:

А) Открытый (торакотомия) — через один большой разрез по межреберью. Обеспечивает широкий доступ к органам грудной клетки, что необходимо для выполнения расширенных и комбинированных операций, включая резекцию смежных структур (перикарда, сосудов, нервов).

Б) Торакоскопический (миниинвазивный) — через один или несколько небольших разрезов с использованием видеоассистированной техники (VATS — видеоассистированная торакоскопическая хирургия) или роботизированной системы (RATS). Преимущества: меньшая инвазивность, сокращённый период восстановления, меньше болей после операции. Однако торакоскопический доступ не всегда технически возможен при крупных, центральных или осложнённых опухолях, требующих обширного вмешательства.

Выбор между открытым и миниинвазивным доступом зависит от: локализации и распространённости опухоли, сопутствующих заболеваний и функциональных резервов пациента (например, сниженные показатели ОФВ1 и максимальной вентиляции лёгких являются противопоказанием к пневмонэктомии), технических возможностей хирургической бригады.

В ряде случаев может потребоваться комбинированный доступ (например, боковая торакотомия с видеоассистенцией) для выполнения расширенных или комбинированных операций с резекцией смежных структур (перикарда, сосудов). Окончательное решение о виде операции и доступе принимает торакальный хирург-онколог после комплексного обследования пациента.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 44

Условия

У больного N., 21 года, при грыжесечении по поводу правосторонней косой паховой грыжи во время выделения грыжевого мешка была повреждена задняя стенка пахового канала медиально от шейки грыжевого мешка. Возникло артериальное кровотечение.

Задания

Назовите источник кровотечения.

Эталоны ответов

Источником артериального кровотечения в описанной ситуации является нижняя надчревная артерия. При правосторонней косой паховой грыже во время выделения грыжевого мешка повреждение задней стенки пахового канала медиально от шейки грыжевого мешка может привести к травмированию и этой артерии. Нижняя надчревная артерия проходит в нижней надчревной области, которая прилежит к паховому каналу, и её ветви кровоснабжают мышцы и апоневрозы передней брюшной стенки в этой зоне. Повреждение задней стенки пахового канала в указанной области создаёт риск повреждения именно этого сосуда, что и может стать источником кровотечения.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 45

Условия

Больному N., 49 лет, с целью оперативного доступа к желудку выполнена верхняя срединная лапаротомия.

Задания

Назовите слои, составляющие стенки лапаротомной раны.

Эталоны ответов

Кожа, подкожная клетчатка, поверхностная фасция, собственная фасция, белая линия живота (сухожильный апоневроз), поперечная фасция, предбрюшинная клетчатка, париетальный листок брюшины (внутренняя оболочка брюшной полости) в порядке от поверхности к полости живота. При ушивании раны её закрывают послойно, начиная с внутреннего слоя (брюшины), затем последовательно соединяют фасции, апоневроз и только потом — кожу с подкожной клетчаткой.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33.

Ситуационная задача № 46

Условия

Больному N., 67 лет, по поводу острого аппендицита произведен разрез по Леннандеру. После смещения прямой мышцы живота в медиальную сторону на задней стенке влагалища обнаружен сосудистый пучок.

Задания

Какие кровеносные сосуды составляют этот пучок?

Эталоны ответов

В этой ситуации в сосудистом пучке, который обнажился после смещения прямой мышцы живота при разрезе по Леннандеру, обычно находятся верхняя надчревная артерия и нижняя надчревная артерия, а также сопровождающие их одноимённые вены.

Разрез по Леннандеру - это параректальный доступ: хирург идёт вдоль наружного края влагалища прямой мышцы живота, чтобы получить доступ к органам правой подвздошной области (в том числе к червеобразному отростку при аппендиците). Когда мышцу смещают медиально (к средней линии), открывается задняя стенка её влагалища. А как раз в ретромускулярном пространстве (позади мышцы, но впереди поперечной фасции) и залегает этот сосудистый пучок. Верхняя надчревная артерия - это продолжение внутренней грудной артерии. Она проникает во влагалище прямой мышцы живота, идёт вдоль его задней стенки и на уровне пупка соединяется с нижней надчревной артерией. Нижняя надчревная артерия отходит от наружной подвздошной артерии. Она направляется вверх, проходит между поперечной фасцией и париетальной брюшиной, а затем тоже входит во влагалище прямой мышцы живота, где и формирует с верхней надчревной артерией тот самый заметный при диссекции пучок.

Хирургу важно быть внимательным в этой зоне: эти сосуды участвуют в формировании коллатералей передней брюшной стенки, и их повреждение может привести к кровотечению.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34.

Ситуационная задача № 47

Условия

Больной N., 48 лет, сделана холецистэктомия. Послеоперационный период осложнился нагноением раны (на глубину до брюшины), в связи с чем были сняты швы. Заживление раны вторичным натяжением. Спустя месяц у больного образовалось грыжевое выпячивание.

Задания

1. Как называется этот вид грыжи?
2. Объясните анатомические предпосылки к возникновению таких грыж.

Эталоны ответов

1. Послеоперационная грыжа.

2. Анатомические предпосылки к возникновению грыж после холецистэктомии (особенно после лапароскопической операции) связаны с особенностями строения передней брюшной стенки, состоянием тканей и техникой хирургического вмешательства. Эти факторы создают «слабые места», через которые при повышении внутрибрюшного давления может выпячиваться содержимое брюшной полости.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ:

А) Слабость соединительной ткани (дисплазия). Это генетически обусловленное состояние, при котором нарушен синтез коллагена и других компонентов экстрацеллюлярного матрикса. Косвенными признаками могут служить сопутствующие проявления: варикозное расширение вен, геморрой, дивертикулёз толстой кишки.

Б) Диастаз прямых мышц живота. Расхождение мышц живота ослабляет каркас передней брюшной стенки, повышая риск грыжеобразования.

В) Предсуществующие фасциальные дефекты. Наличие даже небольшого (более 5 мм) фасциального дефекта до операции значительно повышает риск формирования грыжи в месте хирургического доступа.

Особенности локализации желчного пузыря. При аномальном расположении (например, интрапаренхиматозное — внутри ткани печени) или выраженном воспалительном инфильтрате в области треугольника Кало усложняется выделение пузыря, что может приводить к расширению разреза и, как следствие, к формированию более крупного дефекта при ушивании.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЕРАЦИЕЙ:

Формирование «воронкообразного» дефекта. Если при ушивании был ушит только апоневроз, а париетальная брюшина осталась незакрытой, со стороны брюшной полости образуется сужение («воронка»), которое при повышении внутрибрюшного давления способствует выпячиванию.

Осложнения заживления раны. Гематома, серома или нагноение в области троакарного доступа замедляют регенерацию, приводят к образованию более крупного рубца и ослабляют ткани в этой зоне.

Таким образом, анатомические предпосылки — это комплекс врождённых или приобретённых особенностей (избыточный вес), которые в сочетании с операционными манипуляциями или осложнениями создают условия для образования грыжи. Профилактика включает тщательный предоперационный осмотр, выбор оптимального доступа, бережное обращение с тканями и качественное ушивание раны.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 48

Условия

Больному Н., 42 лет, по поводу прободной брюшнотифозной язвы подвздошной кишки сделана нижняя срединная лапаротомия. Язва ушита кисетным швом с перитонизацией лоскутом большого сальника на «ножке». Лапаротомная рана нагноилась. На третьи сутки заподозрена несостоятельность швов подвздошной кишки. Релапаротомия выполнена правосторонним параректальным разрезом. После релапаротомии развился некроз брюшной стенки между двумя разрезами.

Задания

Дайте анатомическое обоснование этого осложнения.

Эталоны ответов

Анатомическое обоснование развития некроза брюшной стенки между двумя разрезами в описанной ситуации связано с комплексом факторов, включающих нарушение кровоснабжения, натяжение тканей, особенности послеоперационного периода и технические аспекты хирургического вмешательства.

А) Нарушение кровоснабжения тканей.

При нижней срединной лапаротомии рассекаются кожа, подкожная клетчатка, поверхностная и глубокая фасции. Кровоснабжение кожи и мышц в зоне разреза осуществляется в основном за счёт ветвей нижних межреберных артерий, которые формируют сеть, перфорирующую мышцы. При параректальном разрезе были рассечены межреберные, а при продолжении его книзу - нижние надчревные артерия и вена, при срединной лапаротомии - анастомозы кровеносных сосудов правой и левой половин передней брюшной стенки. При ушивании раны натяжение тканей и нарушение микроциркуляции в подкожной клетчатке и мышцах приводят к ишемии — кислородному голоданию, которое является ключевым фактором некроза. При брюшнотифозном процессе стенка кишки часто изменена: имеется воспаление, нарушение микроциркуляции и инфильтрация тканей. Это дополнительно усугубляет ишемические изменения.

Б) Натяжение тканей при ушивании лапаротомной раны.

При нижней срединной лапаротомии доступ к брюшной полости осуществляется по средней линии живота. При послойном ушивании раны происходит сближение краев кожи и мышц. При наличии пареза кишечника или воспалительного инфильтрата в зоне раны натяжение тканей при её закрытии может быть значительным. Это приводит к расхождению краёв раны, образованию карманов, где скапливается гной, и дополнительному нарушению трофики (питания) тканей.

В) Особенности послеоперационного периода

Нагноение лапаротомной раны создаёт очаг хронической инфекции и интоксикации, что негативно сказывается на процессах регенерации и микроциркуляции во всём операционном поле.

Г) Технические аспекты релапаротомии

Релапаротомия выполнена правосторонним параректальным разрезом. При этом, вероятно, произошло дополнительное натяжение тканей в зоне первоначального разреза, что могло усилить ишемию и нарушение трофики тканей между двумя разрезами.

Д) Роль большого сальника

Перитонизация язвы лоскутом большого сальника на «ножке» — это метод, направленный на укрепление линии шва и улучшение условий заживления за счёт использования собственных тканей организма. Однако в условиях уже имеющегося воспаления, нарушения микроциркуляции и натяжения тканей эффективность этого метода могла быть снижена, что способствовало прогрессированию осложнений.

Таким образом, некроз брюшной стенки между двумя разрезами в описанной ситуации является следствием комплексного воздействия: нарушения кровоснабжения тканей, натяжения тканей при ушивании лапаротомной раны, нагноения операционной раны, нарушения процессов заживления и технических особенностей выполнения релапаротомии.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 49

Условия

У больного Н., 26 лет, поступившего в хирургическое отделение с диагнозом: «Острый панкреатит», выявлены симптомы разлитого перитонита.

Задания

Объясните путь распространения экссудата в нижней отдел (этаж) брюшной полости.

Эталоны ответов

При остром панкреатите распространение экссудата в нижние отделы брюшной полости происходит по естественным анатомическим пространствам, которые служат «каналами» для оттока жидкости.

А) Воспаление и разрушение ткани железы приводят к выходу богатого ферментами (трипсином, химотрипсином, липазами) и другими биологически активными веществами экссудата в окружающую парапанкреатическую клетчатку.

Б) Затем экссудат скапливается в сальниковой сумке - замкнутом потенциальном пространстве, где жидкость может застаиваться.

В) Затем следует спуск в боковые каналы и малый таз. Из сальниковой сумки под действием силы тяжести жидкость стекает вниз по брюшным карманам - боковым (латеральному) каналам брюшной полости. Особенно часто процесс спускается через левый боковой канал (по ходу нисходящей ободочной кишки) в клетчаточное пространство малого таза.

Д) Вовлечение подпечёчного пространства. Помимо боковых каналов, экссудат может распространяться и в другие отделы брюшной полости, в том числе в подпечёчное пространство, что также способствует его распространению в нижние отделы.

Таким образом, путь экссудата проходит от первичного очага в поджелудочной железе через парапанкреатическую клетчатку и сальниковую сумку в боковые каналы и малый таз. Это и приводит к развитию разлитого перитонита. Важно отметить, что характер экссудата (серозный, геморрагический, гнойный) и скорость распространения зависят от формы панкреатита (отёчная или деструктивная), а также от присоединения инфекции, что может изменить его свойства и усугубить течение заболевания.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34.

Ситуационная задача № 50

Условия

У больного Н., 16 лет, на восьмые сутки после аппендэктомии появились интенсивные боли в правой половине груди и верхней половине живота, усиливающиеся при вдохе. Имеются симптомы острого воспаления: лихорадка, тахикардия, ознобы, лейкоцитоз, ускоренное СОЭ, анемия, значительное ухудшение общего состояния. При перкуссии правой половины груди и живота установлен симптом Берлоу (при перкуссии от верхушки легкого книзу следующее чередование перкуторного звука: а) перкуторный легочный тон, б) укорочение (притупление) перкуторного тона, в) тимпанит, г) тупость).

Задания

1. Какое осложнение аппендэктомии у больного?
2. Объясните различие оттенков звука перкуторного феномена Берлоу.

Эталоны ответов

1. Правосторонний поддиафрагмальный (газовый) абсцесс с «содружественным» плевритом.
2. Симптом Берлоу - чередование перкуторного звука при исследовании от верхушки легкого книзу:

- а) перкуторный легочный тон (легкое),
- б) укорочение перкуторного тона (выпот в плевральной полости),
- в) тимпанит (газ в поддиафрагмальном абсцессе),
- г) тупость (гной в поддиафрагмальном абсцессе).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 51

Условия

Больная Н., 45 лет, поступила в хирургическое отделение с диагнозом: «механическая кишечная непроходимость». В анамнезе: калькулезный холецистит (13,5 лет). Во время операции установлено, что у больной желчнокаменная кишечная непроходимость.

Задания

Объясните механизм механической кишечной непроходимости как осложнения калькулёзного холецистита.

Эталоны ответов

Механизм развития механической кишечной непроходимости как осложнения калькулёзного холецистита связан с миграцией крупных желчных камней из желчного пузыря в просвет кишечника через сформировавшиеся патологические свищевые ходы. Это состояние также известно как билиарный илеус или желчнокаменная кишечная непроходимость.

А) Хроническое воспаление и формирование свища. При рецидивирующих приступах калькулёзного холецистита развивается стойкий воспалительный процесс. Это приводит к образованию билиодигестивных свищей - патологических соустьев между желчным пузырём и каким-либо отделом желудочно-кишечного тракта. Чаще всего формируются холецистодуоденальные свищи (соединение с двенадцатиперстной кишкой, до 68% случаев, т.к. дно желчного пузыря может быть спаяно с ней), реже - холецистотонкокишечные и холецистоободочные..

Б) Миграция крупного камня. Через образовавшийся свищевой ход в просвет кишечника попадает крупный желчный камень (обычно более 2,5 см в диаметре). Такие камни не могут пройти естественным путём через билиарные протоки. Камень из желчного пузыря мигрирует в 12-перстную кишку, затем тощую и подвздошную. Поскольку ширина подвздошной кишки меньше тощей, имеется вероятность желчнокаменной кишечной непроходимости на уровне подвздошной кишки.

В) Обтурация (закупорка) просвета кишки. Попадая в просвет кишечника, камень механически перекрывает его просвет, создавая препятствие для продвижения содержимого. Чаще всего камень застревает в терминальном отделе подвздошной кишки или в области илеоцекального угла из-за меньшего диаметра этих участков. В редких случаях непроходимость может развиваться и при попадании более мелких конкрементов, но тогда она обусловлена патологическим спазмом стенки кишки в ответ на раздражение.

Г) Развитие клинической картины. Обструкция приводит к нарушению пассажа содержимого по кишечнику. Это вызывает характерные симптомы: схваткообразные боли в животе, задержку стула и газов, рвоту. По мере прогрессирования непроходимости нарастают признаки интоксикации и обезвоживания

Желчнокаменная кишечная непроходимость - редкое осложнение калькулёзного холецистита (встречается в 0,3–3,0% случаев) и казуистическая причина механической кишечной непроходимости (0,1–4,0%). С возрастом риск развития этого осложнения увеличивается, и среди пациентов старше 65 лет оно диагностируется примерно в 25% случаев обтурационной тонкокишечной непроходимости.

Наличие свища между желчным пузырём и двенадцатиперстной кишкой, приводящее к миграции камня и обтурации, известно как синдром Бувере.

При отсутствии своевременного лечения возможны серьёзные последствия: некроз стенки кишечника, её прободение с развитием калового перитонита, дегидратация, гиповолемический и токсический шок, септические осложнения.

Для диагностики используются инструментальные методы, такие как ультразвуковое исследование органов брюшной полости и компьютерная томография, которая считается наиболее информативным исследованием в таких случаях. Лечение обычно хирургическое — требуется удаление камня и устранение свища.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 52

Условия

В хирургическое отделение поступил больной Н., 40 лет, с картиной «острого живота» после тупой травмы. При лапароскопии патологии не выявлено. Через 20 часов у больного

появились симптомы перитонита. При лапаротомии обнаружена гематома забрюшинного пространства и некроз стенки одного из органов верхнего отдела брюшной полости.

Задания

1. Стенка какого органа, прилежащего к забрюшинному пространству, подверглась некрозу?
2. Каким способом можно произвести осмотр этого органа?

Эталоны ответов

1. Чаще всего повреждение двенадцатиперстной кишки сопровождается формированием забрюшинной гематомы, а нарушение кровоснабжения стенки кишки на этом фоне может привести к её некрозу. Некроз задней стенки 12-перстной кишки в результате нарушения кровоснабжения, обусловленного разрывом верхней панкреатодуоденальной артерии.

2. Для осмотра этого органа при лапаротомии применяется специальный хирургический приём - мобилизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру. Этот приём позволяет отвести восходящую ободочную кишку и ДПК с головкой поджелудочной железы медиально и обеспечить доступ к забрюшинным структурам, в том числе к нисходящей части двенадцатиперстной кишки.

Дополнительными признаками, которые помогают подтвердить диагноз могут служить: выпот желтоватого цвета в брюшной полости, забрюшинная эмфизема (скопление воздуха) и студенистый отёк и жёлто-зелёное прокрашивание тканей в области повреждённой кишки.

После мобилизации производят ушивание раны кишки двухрядным швом, выполняют назодуоденальную интубацию, а забрюшинное пространство дренируют через лумботомию. При подозрении на повреждение двенадцатиперстной кишки или другого органа верхнего отдела брюшной полости требуется немедленное хирургическое вмешательство. Консервативное лечение в таких случаях неэффективно и опасно.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 53

Условия

Больному N., 22 лет, по поводу «острого аппендицита» сделан разрез по Н. М. Волковичу-П. И. Дьяконову. В брюшной полости обнаружено желудочное содержимое.

Задания

1. Какое заболевание должен заподозрить хирург?
2. Каким образом желудочное содержимое оказалось в правой подвздошной ямке?

Эталоны ответов

1. Обнаружение в брюшной полости желудочного содержимого в правой подвздошной ямке указывает на перфорацию (прободение) язвы желудка или двенадцатиперстной кишки

2. Желудочное содержимое по правому латеральному каналу распространилось из верхнего отдела брюшной полости в нижний (в правую подвздошную ямку). В этой области агрессивное содержимое вызывает воспаление брюшины, что может имитировать клиническую картину острого аппендицита. Такое состояние иногда называют «ложным аппендицитом».

Для дифференциальной диагностики важны: правильно собранный анамнез (наличие язвы желудка или двенадцатиперстной кишки в прошлом, характерное начало заболевания — внезапные боли в эпигастральной области, сравнимые с ударом кинжала); исчезновение печёночной тупости при перкуссии; обнаружение свободного газа в брюшной полости при рентгенологическом исследовании.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 2.33, 2.36

Ситуационная задача № 54

Условия

Больная Н., 66 лет, доставлена в хирургическое отделение с диагнозом: «Острая тонкокишечная непроходимость». Консервативное лечение оказалось неэффективным. При лапаротомии обнаружено ущемление небольшого участка противобрыжеечного края стенки тощей кишки на уровне II поясничного позвонка в нижнем дуоденальном углублении.

Задания

1. Дайте определение этому патологическому процессу.
2. Какие острые хирургические заболевания органов верхнего отдела (этажа) брюшной полости может симулировать этот патологический процесс?

Эталоны ответов

1. Ущемление небольшого участка противобрыжеечного края стенки тощей кишки в нижнем дуоденальном углублении — это внутренняя грыжа (в частности, грыжа Трейтца). Это разновидность внутренней грыжи, при которой происходит выпячивание внутренних органов (чаще петель тонкого кишечника) в дуоденально-еюнальный карман (карман Трейтца). Содержимым грыжевого мешка является небольшой участок противобрыжеечного края кишки с пристеночным (Литреевским) ущемлением.
2. Грыжа может симулировать ущемлённую грыжу (например, паховая, бедренная, пупочная, грыжа белой линии живота), странгуляционную кишечную непроходимость, острую кишечную непроходимость, вызванная спайками, перфоративную язву желудка или двенадцатиперстной кишки, острые воспалительные заболевания органов верхнего этажа и острые гинекологические заболевания.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 55

Условия

У больного Н., 67 лет, при лапаротомии по поводу «острого живота» обнаружен некроз части подвздошной кишки, илеоцекального угла, слепой и восходящей ободочной кишки.

Задания

Тромбэмболия какой артерии и на каком уровне обусловила некроз кишечника в указанных пределах?

Эталоны ответов

Тромбэмболия верхней брыжеечной артерии (ВБА) на уровне дистальных отделов ВБА или её интестинальные ветви. ВБА кровоснабжает дистальную часть двенадцатиперстной кишки, тощую и подвздошную кишку, а также толстую кишку до селезёночного угла. Также может наблюдаться тромбэмболия подвздошно-ободочнокишечной артерии - ветви ВБА, которая обеспечивает кровоснабжение конечного отдела тонкой кишки (подвздошной), слепой кишки, червеобразного отростка (аппендикса) и начального участка восходящей ободочной кишки.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36.

Ситуационная задача № 57

Условия

У больного Н., 47 лет, при операции по поводу острой кишечной непроходимости обнаружен тяж от противобрыжеечного края подвздошной кишки (50 см от илеоцекального угла) к пупку.

Задания

1. Назовите один из видов неполного обратного развития желточного протока, ставшего причиной острой кишечной непроходимости.
2. Какова тактика хирурга (нарушения кровоснабжения кишки нет)?

Эталоны ответов

1. Дивертикул Меккеля - один из видов неполного обратного развития желточного протока, который может стать причиной острой кишечной непроходимости. В отдельных случаях нарушения обратного развития желточного протока дивертикул Меккеля может превратиться в прочный рубцовый тяж, прикрепляющийся изнутри к пупочному кольцу. Это может привести к острой кишечной непроходимости.

2. Тактика хирурга в данной ситуации (при условии, что нарушения кровоснабжения кишки нет):

А) Ревизия брюшной полости. После доступа (чаще срединная лапаротомия, но при технических возможностях возможна лапароскопия) хирург тщательно осматривает брюшную полость, чтобы локализовать тяж и оценить степень нарушения пассажа.

Б) Устранение препятствия. Основной шаг это рассечение тяжа с последующей перевязкой его концов (у обоих - и у того, что идёт к кишке, и у места прикрепления к брыжейке). Цель: освободить кишку от сдавления.

В) Оценка жизнеспособности кишки. После устранения тяжа критически важно проверить, не нарушено ли кровоснабжение стенки кишки (странгуляция). Если стенка кишки изменила цвет (посинела, стала тёмной, потеряла перистальтику), в этом месте может потребоваться резекция (удаление) нежизнеспособного участка с последующим наложением анастомоза. Если кишка жизнеспособна, анастомоз формируют без натяжения.

Г) Часто для декомпрессии (снятия давления) и профилактики рецидива в просвет кишки устанавливают назоинтестинальный зонд.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 58

Условия

Больному N., 42 лет, с целью удаления инородного тела тонкой кишки произведена энтеротомия (разрез кишки в продольном направлении длиной 2,5 см). После извлечения инородного тела хирург приступил к ушиванию раны.

Задания

1. Назовите один из видов неполного обратного развития желточного протока, ставшего причиной острой кишечной непроходимости.

2. Какова тактика хирурга (нарушения кровоснабжения кишки нет)? В каком направлении должна быть ушита рана кишки? Какие швы будет использовать хирург?

Эталоны ответов

Рану кишки (во избежание стеноза) ушивают в поперечном направлении классическим двухрядным швом: первый ряд - вворачивающий шов Шмидена (скоряжный) рассасывающимся материалом (полисорб, викрил, дексои, максон, PDS, кетгут); второй ряд - узловый серозно-мышечный шов Ламбера нерассасывающимся материалом (полипропилен, монофиламентный полиамид, шелк).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36.

Ситуационная задача № 59

Условия

При ушивании резаной раны тонкой кишки хирург использует шов В. П. Матешука.

Задания

Что представляет собой этот кишечный шов?

Эталоны ответов

Краевой однорядный узловый серозно-мышечноподслизистый шов с внутренним расположением узелков. Техника наложения: иглу вкалывают со стороны края раны в подслизистый слой и через мышечную и серозную оболочки выводят нить наружу с одной стороны, на

противоположной стороне нить проводят через серозно-мышечную оболочку и подслизистый слой, узлы завязывают со стороны просвета кишки. В отличие от шва Пирогова, первый вкол при наложении шва Матешука производят не со стороны серозной оболочки, а на границе слизистой оболочки и подслизистого слоя, а выкол — на серозной оболочке. На другом краю раны, наоборот, вкол производят со стороны серозной поверхности, а выкол — в разрез раны на границе подслизистого и слизистого слоёв. Благодаря этому узел завязывается в просвете кишки, а не со стороны серозного покрова, как при шве Пирогова. Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36.

Ситуационная задача № 60

Условия

При гастростомии хирург использует левосторонний трансректальный разрез. При рассечении париетальной брюшины в верхнем углу раны в плевральную полость стал поступать воздух (пневмоторакс).

Задания

Каким образом осуществляют профилактику этого осложнения?

Эталоны ответов

Чтобы минимизировать риск, хирург должен строго соблюдать технику:

А) Аккуратное рассечение брюшины. Париетальную брюшину необходимо рассекать строго послойно, избегая чрезмерного расширения раны и повреждения глубже лежащих структур.

Б) Контроль глубины разреза. Разрез должен выполняться с учётом анатомических ориентиров, чтобы не проникнуть в грудную полость. Левосторонний трансректальный разрез целесообразно начинать на 2 - 2,5 см книзу от реберной дуги.

В) Тщательная герметизация. После манипуляций с желудком (выведения его стенки в рану, фиксации трубки) критически важно обеспечить полную герметизацию брюшной полости. Для этого стенку желудка вокруг выхода трубки подшивают узловыми швами к париетальной брюшине и заднему листку влагалища прямой мышцы живота. Это создаёт барьер, препятствующий распространению воздуха.

Г) Послойное ушивание раны. Все слои брюшной стенки (мышцы, фасции, брюшина) должны ушиваться без натяжения, чтобы не создавать «слабых мест», через которые может подсасывать воздух.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 61

Условия

У больного Н., 54 лет, цирроз печени. На фоне консервативной терапии нарастают явления портальной гипертензии (кровотечение из подслизистого венозного сплетения пищеводно-желудочного соединения).

Задания

Какое из оперативных вмешательств наиболее рационально и эффективно для снижения давления в воротной вене?

Эталоны ответов

1. Наиболее рациональным и эффективным методом снижения давления в воротной вене считается трансъюгулярное внутрипечёночное портосистемное шунтирование (TIPS). Это малоинвазивное рентгеноэндоваскулярное вмешательство, при котором создаётся искусственный канал (шунт) между крупными печёночными венами и ветвями воротной вены с помощью имплантации металлического стента. Это обеспечивает отток крови из воротной вены в системный кровоток, минуя поражённую печёночную ткань, что эффективно снижает давление в воротной системе и предупреждает осложнения портальной гипертензии (например, кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка,

рефрактерный асцит). TIPS отличается высокой эффективностью, позволяющая снизить давление в воротной вене до 7-12 мм рт.ст., малоинвазивность, возможность комбинирования с другими вмешательствами. Процедура требует высокой квалификации хирурга и тщательного предоперационного обследования для оценки анатомии сосудов.

2. Открытые операции портокавального шунтирования (например, дистальный спленоренальный анастомоз) также эффективны для снижения давления в портальной системе. Однако они сопряжены с более высоким риском осложнений, таких как прогрессирование печёночной недостаточности и развитие портосистемной энцефалопатии.

3. Операции портосистемного разобщения (прошивание варикозных узлов пищевода и желудка, деваскуляризация) направлены на уменьшение притока крови к варикозно расширенным венам, но не всегда обеспечивают столь же выраженное и стабильное снижение давления, как шунтирующие операции.

4. Сплено-ренальный венозный анастомоз - это хирургическая операция, при которой создают искусственное соединение между селезёночной веной и левой почечной веной и имеющая несколько вариантов.

А) Дистальный спленоренальный анастомоз. Считается одним из наиболее предпочтительных вариантов. Его накладывают по типу «конец в бок», при этом селезёнку и почку сохраняют. Такой подход позволяет максимально сохранить естественный воротный кровоток и минимально нарушает функцию печени, так как декомпрессии подвергается только гастролиенальная зона.

Б) Проксимальный спленоренальный анастомоз. Его иногда комбинируют со спленэктомией (удалением селезёнки). Однако у этого варианта есть свои риски, например, более высокая вероятность развития печёночной энцефалопатии и печёночной недостаточности.

В) Н-образный анастомоз. Это более сложная модификация, при которой формируют два анастомоза. Манжетку накладывают поверх венозной вставки, а затем создают второй анастомоз, выбор которого зависит от конкретной клинической ситуации.

В ходе операции хирург выполняет доступ к сосудам (через желудочно-ободочную связку, левый брыжеечный синус или другие подходы). Затем выделяет селезёночную и левую почечную вены, пересекает селезёночную вену (часто по косой линии) и формирует анастомоз: «конец в конец» — соединение двух концов вен; «конец в бок» - более распространённый вариант, при котором одна вена имеет открытый конец, а другая — боковое отверстие. Иногда для устранения натяжения или при значительном расстоянии между сосудами используют венозную вставку (например, из аутовены или гомографта), но это повышает риск её сдавления или тромбоза в послеоперационном периоде.

5. Спленэктомия (удаление селезёнки) сама по себе не снижает давление в воротной вене, хотя может уменьшать приток крови по селезёночной артерии.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 62

Условия

Больному N., 44 лет, с острым панкреатитом выполнена верхняя срединная лапаротомия.

Задания

1. Какой из доступов в сальниковую сумку является методом выбора при остром панкреатите?

2. Каким образом можно обеспечить наружное дренирование и изоляцию сальниковой сумки от свободной брюшной полости?

Эталоны ответов

1. При остром панкреатите методом выбора для доступа в сальниковую сумку часто считается верхняя срединная лапаротомия. Этот доступ считается универсальным, так как позволяет объективно оценить объём и распространённость некротического процесса в

поджелудочной железе и парапанкреатических тканях. Проводят пересечение желудочно-ободочной связки обеспечивает доступ к передней поверхности поджелудочной железы и задней стенке желудка, что используется, в частности, при операциях Уиппла, дистальной панкреатэктомии. Этот доступ исключает распространение экссудата и нижним этажом брюшной полости.

2. Для обеспечения наружного дренирования и изоляции сальниковой сумки от свободной брюшной полости могут применяться следующие методы:

А) Рассечение желудочно-ободочной связки для вскрытия сальниковой сумки. Это позволяет получить доступ к поджелудочной железе и провести ревизию, удаление некротических участков, санацию полости.

Б) Формирование бурсооментостомы (оментобурсостомы). Края рассечённой желудочно-ободочной связки подшивают к париетальной брюшине краёв лапаротомной раны, создавая асептическое пространство. Это обеспечивает изоляцию сальниковой сумки от свободной брюшной полости.

В) Установка дренажей. В сальниковую сумку могут вводиться одно- или двухпросветные дренажные трубки для фракционного или капельного подведения в очаг деструкции раствора антисептика с последующей активной аспирацией.

Г) Сквозное дренирование. Дренажные трубки вводят через срединную лапаротомную рану, желудочно-ободочную связку в сальниковую сумку, затем — через создаваемый канал в забрюшинном пространстве от хвоста поджелудочной железы под селезёночным углом ободочной кишки и выводят через разрез в левой поясничной области.

Д) Абдоминализация поджелудочной железы. Рассечение париетальной брюшины по верхнему и нижнему краю поджелудочной железы с отделением органа от забрюшинной клетчатки тупым путём. Это позволяет разгерметизировать парапанкреатическую клетчатку, вывести железу из забрюшинного пространства в брюшную полость и предотвратить поступление токсического экссудата с задней поверхности железы в забрюшинную клетчатку.

Выбор метода зависит от фазы заболевания, распространённости некротического процесса, наличия осложнений и других факторов. Решение о хирургическом вмешательстве принимает врач на основе клинической картины и данных обследования.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 63

Условия

У больного Н., 21 лет, после спленопортографии констатирована бледность кожи, частый пульс, головокружение, падение артериального давления.

Задания

1. На какое грозное осложнение указывают эти симптомы?
2. Каким образом можно уменьшить риск его возникновения?

Эталоны ответов

1. Обильное внутрибрюшное кровотечение из-за травмы селезёнки пункционной иглой. Разрыв селезёнки.

2. Для уменьшения риска возникновения такого осложнения могут применяться следующие меры:

Тщательная предоперационная оценка состояния пациента. Перед спленопортографией необходимо провести комплексное обследование, включая оценку общего состояния здоровья, выявление противопоказаний, анализ анамнеза и возможных рисков. Постоянный контроль за гемостазом во время и после процедуры. Важно обеспечить надёжный гемостаз во время вмешательства, а также тщательное наблюдение за состоянием пациента в раннем послеоперационном периоде. Использование современных диагностических методов. Для своевременного выявления возможных осложнений (например, кровотечения) могут

применяться УЗИ, КТ, эндоскопия и другие методы. Контроль положения иглы при пункции или катетеризации. Важно убедиться, что игла или катетер находятся в нужном месте и не повредили сосуды. Мониторинг жизненно важных функций. После процедуры необходимо регулярно контролировать артериальное давление, пульс, частоту дыхания и другие показатели. Своевременное выявление и коррекция возможных осложнений. При появлении первых признаков ухудшения состояния требуется немедленное медицинское вмешательство. Обеспечить задержку дыхания при пункции селезенки.

Для снижения риска осложнений была разработана лапароскопическая методика проведения исследования. В современной практике метод используется реже из-за развития неинвазивных способов диагностики (УЗИ, КТ, МР-ангиография), но остаётся ценным для уточнения сложных случаев.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.310, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 64

Условия

У больного Н., 27 лет, после лапаротомии и оперативного доступа в сальниковую сумку (через желудочно-ободочную связку) обнаружен некроз тела и хвоста поджелудочной железы, абсцессы забрюшинного пространства с образованием затека в боковое клетчаточное пространство подбрюшинной полости таза.

Задания

Объясните путь гнойного затека у этого больного. Укажите возможный уровень распространения гнойного затека при некрозе головки поджелудочной железы.

Эталоны ответов

При некрозе тела и хвоста поджелудочной железы гной затекает по левому околоободочному пространству в подбрюшинную полость (боковое клетчаточное пространство) малого таза; при некрозе головки - до слепой кишки.

Последовательность распространения:

- А) Первичный очаг - зона некроза в теле и хвосте поджелудочной железы.
- Б) Забрюшинное пространство - гной проникает в парапанкреатическую клетчатку, затем распространяется по забрюшинным клетчаточным пространствам.
- В) Боковое клетчаточное пространство - по ходу восходящей/нисходящей ободочной кишки, вдоль почечных фасций.
- Г) Подбрюшинная полость таза - через пояснично-подвздошные отверстия или по ходу сосудов/нервных стволов.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 65

Условия

С целью уточнения диагноза при заболеваниях почек применяется селективная ангиография: рентгеноконтрастное вещество вводится через катетер, подведенный к устью почечной артерии.

Задания

1. Как называется этот катетер?
2. Каким путем он подводится к устью почечной артерии?
3. На уровне каких позвонков находятся устья почечных артерий?

Эталоны ответов

1. Катетер, который подводится к устью почечной артерии при селективной ангиографии, называется диагностическим катетером. В практике могут использоваться различные модели, например, Cobra №2, Judkins Right 4.0.
 2. Путь подведения катетера к устью почечной артерии — через интродьюсер, который устанавливают в артерию (чаще всего в бедренную или лучевую). Через интродьюсер под контролем флюороскопии (рентгеновского просвечивания) проводят диагностический катетер посредством пункции и катетеризации артерии по Сельдингеру.
 3. Устья почечных артерий находятся на уровне поясничных позвонков — чаще всего на уровне I поясничного позвонка (L1). В некоторых случаях уровень может варьироваться — от нижнего края XII грудного позвонка (ThXII) до межпозвоночного диска между LII и LIII.
- Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.310.

Ситуационная задача № 66

Условия

У больной N., 26 лет, диагностирован параметрит. Из анамнеза: 1,5 . мес. до обращения к гинекологу больная находилась на лечении по поводу цистита.

Задания

1. Каким строением мочеиспускательного канала определяются частота цистита у женщин?
2. Объясните взаимосвязь цистита и параметрита.

Эталоны ответов

1. Строение мочеиспускательного канала у женщин (уретры) во многом определяет более высокую частоту цистита по сравнению с мужчинами. У женщин уретра короткая (в среднем 3–5 см) и относительно широкая (6–12 мм), а её наружное отверстие расположено близко к влагалищу и анальному отверстию. Такая анатомия создаёт благоприятные условия для проникновения и восходящего распространения патогенных микроорганизмов в мочевой пузырь.

Некоторые особенности строения уретры, повышающие риск цистита:

- влагалищная эктопия — аномальное расположение наружного отверстия уретры, часто на границе с влагалищем. Это способствует постоянному забрасыванию микрофлоры из влагалища в уретру, особенно во время полового акта.
- гипермобильность уретры - повышенная подвижность, при которой отверстие может сильно смещаться к влагалищу. Часто связана с уретро-гименальными спайками.
- зияние наружного отверстия уретры - также облегчает проникновение микрофлоры.
- неправильное направление струи мочи - при турбулентном потоке (завихрениях) бактерии могут заноситься обратно в мочевой пузырь

2. Лимфатические сосуды и вены мочевого пузыря имеют прямые связи с сосудами матки и влагалища (в основании широкой связки и внутренних подвздошных лимфоузлах).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 67

Условия

Больной N., 18 лет, для уточнения диагноза: «Нарушенная внематочная беременность» выполнена пункция заднего свода влагалища.

Задания

1. В каком случае при этом исследовании будет подтвержден диагноз?
2. Какова тактика при подтверждении диагноза?

Эталоны ответов

1. Нарушенная внематочная беременность подтверждается наличием крови из брюшной полости, а не из кровеносного сосуда (полученную кровь осматривают на белом фоне: кровь

из брюшной полости темного цвета с мелкой зернистостью (свертывание вне сосудистого русла); кровь из сосуда (свежая) зернистости не должна иметь.

2. При получении крови из брюшной полости предпринимается лапаротомия.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 68

Условия

У больной Н., 65 лет, выпадение шейки матки. В анамнезе хронический бронхит, трое родов (первые роды были осложнены разрывом «акушерской промежности» 111 степени).

Задания

1. Что значит «акушерская» промежность?
2. Какие факторы объясняют причину выпадения шейки матки у больной Н.?

Эталоны ответов

1. «Акушерская» промежность - часть тазового дна между задней спайкой больших половых губ и передним краем задне-проходного отверстия. В положении anteflexio-anteversio матка опирается с одной стороны на мочевой пузырь и лобковые кости, с другой - на тазовое дно (мочеполовую диафрагму).

2. У больной Н. имеется недостаточность тазового дна вследствие рубцовых и возрастных изменений с утратой его опорной функции. При несостоятельности тазового дна происходит значительное расширение hiatus genitalis, что можно уподобить «грыжевым воротам» (Р. Р. Макаров, А. А. Габелов).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 69

Условия

В проктологической практике выделяют две формы геморроя: наружный и внутренний.

Задания

1. Укажите источники возникновения этих форм геморроя.
2. Почему геморроидальные узлы, как правило, локализуются на 3, 7, 11 часах (при положении больного на спине).

Эталоны ответов

1. На 7-8 неделе эмбрионального развития в подслизистом слое прямой кишки на уровне столбов Морганьи и под кожей вокруг заднепроходного отверстия закладывается кавернозная ткань. При наружном геморрое узлы развиваются из венозно-артериального сплетения нижних прямокишечных сосудов, равномерно распределяющихся под перианальной кожей. Внутренние узлы происходят из кавернозной ткани подслизистого слоя на уровне столбов Морганьи.

2. Анатомическая причина заключается в том, что в этих точках в подслизистом слое анального канала формируются группы кавернозных (пещеристых) вен. Эти образования закладываются ещё в процессе эмбрионального развития.

Ключевой фактор - особенности кровоснабжения. Верхняя прямокишечная артерия, которая обеспечивает основной приток артериальной крови к геморроидальным сплетениям, делится на три концевые ветви. Эти ветви идут по линиям, проецирующимся на участки анального канала, соответствующие 3, 7 и 11 часам условного циферблата (при положении тела на спине).

В указанных зонах в подслизистом слое образуются группы кавернозных вен, которые связаны между собой анастомозами (соединительными путями) и коллатеральями, включая прямые артериовенозные анастомозы («улитковые артерии»).

Таким образом, три основные внутренние геморроидальные узла формируются именно в проекции этих трёх сосудистых зон.

Важно отметить, что в некоторых случаях кавернозные тельца могут располагаться диффузно, без чёткой группировки. Также иногда формируются дополнительные (второстепенные) узлы, связанные с основными.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.311.

Ситуационная задача № 70

Первым этапом хирургического вмешательства при парапроктите является вскрытие и дренирование околопрямокишечного гнойника радиальным или полулунным разрезом.

Задания

1. При какой форме парапроктита применяют радиальный разрез, при каких - полулунные?
2. Объясните сущность второго этапа хирургического вмешательства при парапроктите.

Эталоны ответов

1. Радиальный - при подслизистой форме парапроктита, когда свищевой ход находится кнутри от сфинктера (при рассечении свищевого хода не травмируются волокна сфинктера заднего прохода); полулунные - при подкожной, седалищно-прямокишечной, тазовопрямокишечной, позадипрямокишечной формах.
2. Сущностью второго этапа операции при парапроктите является ликвидация внутреннего отверстия (свища) гнойника, находящегося в прямой кишке.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 71

Условия

Хирург производит ушивание раны стенки мочевого пузыря.

Задания

1. Какими анатомическими взаимоотношениями этого органа с брюшиной определяется различие техники ушивания раны его стенки?
2. Сколько рядов швов следует наложить на стенку мочевого пузыря? Какие слои органа захватывают в шов?

Эталоны ответов

1. В опорожненном состоянии мочевой пузырь располагается подбрюшинно (серозной оболочкой покрыт частично спереди, с боков, и сзади), при наполнении - мезоперитонеально. Поэтому различают брюшинный и внебрюшинный отделы этого органа.
2. Рану брюшинного отдела ушивают двухрядным швом: 1-й ряд - нитью из рассасывающегося материала с захватыванием мышечной оболочки (слизистая оболочка не захватывается!); 2-ой ряд - тонкой нерассасывающейся нитью серозно-мышечный. В мочевой пузырь на несколько дней вводят постоянный катетер. При ранениях внебрюшинного отдела на доступные отделы мочевого пузыря накладывают двухрядный шов. Во второй ряд захватывают висцеральную (предпузырную) фасцию и мышечную оболочку. Операцию завершают наложением мочевого свища.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311.

Ситуационная задача № 72

Условия

В проктологическое отделение поступила больная Н., 47 лет. Диагноз: «Рак прямой кишки

III-IV стадии. Опухоль локализуется в 10 см от заднепроходного отверстия».

Задания

1. С какой целью следует произвести исследование печени (УЗИ, компьютерная томография и др.)?
2. Укажите лимфогенные пути метастазирования рака прямой кишки.

Эталоны ответов

1. Для исключения метастазов в печень гематогенным путем (верхняя прямокишечная > нижняя брыжеечная > воротная вена > ветви воротной вены в печени) и решения вопроса о возможности радикальной операции. У больной N. метастазы в первую очередь могут быть в нижних брыжеечных лимфоузлах.
2. В условиях атипичных путей оттока лимфы от прямой кишки метастазирование происходит во внутренние подвздошные, крестцовые и паховые лимфоузлы, поскольку эти группы являются регионарными для прямой кишки.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.310, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 73

Условия

Как отмечают, геморроидэктомия по Миллигану-Моргану в модификации НИИ проктологии является более совершенной операцией, по сравнению с другими операциями (перевязка и отсечение геморроидальных узлов по А. В. Мартынову - А. Н. Рыжих).

Задания

В чем сущность геморроидэктомии по Миллигану-Моргану в модификациях НИИ проктологии?

Эталоны ответов

1-я модификация: геморроидальные узлы на 3, 7, 11 часах иссекают снаружи внутрь, прошивают и отсекают. Три раневые поверхности перианальной кожи и стенок заднепроходного канала частично ушивают; в шов захватывают один край перианальной кожи и слизистой оболочки и подшивают его к середине дна каждой раны. При этом раневая поверхность уменьшается, при сохранении открытого участка по всей длине каждой раны для оттока раневого отделяемого.

2-я модификация: на ложе каждого узла в радиальном направлении накладывают зажим Бильрота, концы браншей которого доходят до сосудистой «ножки». Над зажимом узел иссекают снаружи вовнутрь до основания сосудистой «ножки», которую прошивают и перевязывают хромированным кетгутом, узел отсекают. Под зажимом ложе узла прошивают тонким кетгутом, захватывая края слизистой оболочки и дно раны. Наружные геморроидальные узлы иссекают в виде лепестков, кожную часть раны ушивают узловыми швами кетгутом.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 74

Условия

Больной N., 53 лет, по поводу рака прямой кишки производят брюшно-промежностную экстирпацию. В ходе операции хирург встретился с трудностями мобилизации передней стенки прямой кишки.

Задания

Какая особенность строения фасциальной капсулы прямой кишки объясняет трудности отделения передней стенки этого органа от влагалища?

Эталоны ответов

Фасциальная капсула (капсула Амюсса) образована фасцией прямой кишки. В формировании переднего отдела этой капсулы участвует прямокишечно-влагалищная перегородка (брюшинно-промежностная фасция или апоневроз Денонвильер-Э.Г. Салищева), которая является общей для задней стенки влагалища и передней стенки прямой кишки (разделяя и) соединяя стенки этих органов.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 75

Условия

У Н., 26 лет, перелом лобковой кости с внебрюшинным повреждением стенки мочевого пузыря.

Задания

Какие принципы должны быть положены в основу хирургической обработки раны в данной ситуации?

Эталоны ответов

- 1) Ушить рану мочевого пузыря (если имеется такая возможность) двухрядным швом без захватывания слизистой оболочки;
- 2) обеспечить отведение мочи из мочевого пузыря (цистостомия);
- 3) обеспечить дренирование (лобково-бедренная или лобковопромежностная методика проведения дренажа) залобкового (предпузырного) пространства.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311.

Ситуационная задача № 76

Условия

При внебрюшинном повреждении мочевого пузыря возникает необходимость дренирования залобкового (предпузырного) пространства.

Задания

Какие методы дренирования могут быть применены у больных при флегмонах этого пространства?

Эталоны ответов

- 1) Брюшностеночный - через переднюю брюшную стенку (поперечный или продольный внебрюшной доступ);
- 2) доступ к подбрюшинной полости таза через запирающее отверстие (в стороне от запирающего канала) со стороны медиальной поверхности бедра (ложе приводящих мышц) по И.В. Буяльскому - Мак-Уортеру;
- 3) выведение дренажа на промежность по П. А. Куприянову;
- 4) выведение дренажа параректально через седалищноанальную ямку (при сочетанных повреждениях мочевого пузыря и прямой кишки).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 77

Условия

Строгие показания к паранефральной новокаиновой блокаде обусловлены частотой возникновения тяжёлых осложнений вследствие не соблюдения техники её выполнения.

Задания

Перечислите возможные осложнения этой блокады по А.В. Вишневскому.

Эталоны ответов

- 1) Кровотечение вследствие повреждения почки (околопочечная гематома);
 - 2) введение раствора новокаина под собственную капсулу почки (резкое повышение внутривисцерального давления);
 - 3) повреждение почечной и нижней полой вен (справа);
 - 4) повреждение восходящей (справа) и нисходящей (слева) ободочной кишки.
- Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 78

Условия

У больного Н., 23 лет, в процессе аппендэктомии (при ретроцекальном положении червеобразного отростка) обнаружена забрюшинная флегмона.

Задания

1. В каком слое забрюшинной клетчатки локализуется гнойный очаг?
2. Укажите возможные границы его распространения.
3. Как объяснить выраженную сгибательную контрактуру бедра при забрюшинной флегмоне аппендикулярного происхождения?

Эталоны ответов

1. В клетчатке позади восходящей ободочной кишки (в правом околоободочном пространстве).
2. Распространение флегмоны определяется границами этого слоя забрюшинной клетчатки: сверху - до корня брыжейки поперечной ободочной кишки; снизу - до слепой кишки; латерально - до брюшиннофасциального узла правого латерального канала (места соединения париетальной брюшины с забрюшинной фасцией); медиально - до корня брыжейки тонкой кишки.
3. Вовлечение в гнойный процесс большой поясничной мышцы.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36.

Ситуационная задача № 79

Условия

Интраоперационная холангиография после холецистэктомии позволила установить рубцовый стеноз терминального отдела общего желчного протока (печечно-поджелудочной ампулы) протяженностью более 2 см.

Задания

1. Назовите метод дренирования внепеченочных желчных путей, который следует использовать в этой ситуации.
2. Какая операция показана при рубцовом стенозе меньшей протяженности?

Эталоны ответов

1. Один из видов внутреннего дренирования внепеченочных желчных путей (билиодигестивный анастомоз, в частности, супрадуоденальную холедоходуоденостомию).
2. При рубцовом стенозе меньшей протяженности показана эндоскопическая папиллосфинктеротомия.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.310, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 80

Условия

У больной Н., 45 лет, острый холецистит. Выполнен оперативный доступ к желчному пузырю по С.П. Федорову. Обнаружен выраженный спаечный процесс в области желчного

пузыря и печеночно-дуоденальной связки.

Задания

1. Какой способ холецистэктомии будет использовать хирург? Почему?
2. Какие недостатки имеет этот способ?

Эталоны ответов

1. Холецистэктомию «от дна» (антеградную), поскольку при спаечном процессе затруднены выделение и верификация внепеченочных желчных протоков и кровеносных сосудов в печеночно-дуоденальной связке и воротах печени.

2. Недостатками холецистэктомии «от дна» являются:

- 1) возможность миграции камней из желчного пузыря в общий желчный проток;
- 2) большая травматичность и кровопотеря;
- 3) опасность инфицирования брюшной полости при повреждении полых органов, участвующих в спайках с желчным пузырем (двенадцатиперстная кишка, правый изгиб ободочной кишки).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 81

Условия

Во время холецистэктомии, вследствие разрыва печени, возникло кровотечение.

Задания

1. Назовите приемы, позволяющие обеспечить временный гемостаз.
2. На какое время может применяться временная остановка кровотечения с использованием этих приемов.

Эталоны ответов

1. Приём Прингла — временное пережатие печёчно-двенадцатиперстной связки (с проходящими в ней общей печёчной артерией и воротной веной). Для этого применяют мануальную компрессию либо наложение мягкого атравматичного зажима. Пальцевое сдавление печеночно-дуоденальной связки (собственной печеночной артерии и воротной вены) между большим и введенным в сальниковое отверстие указательным пальцами левой руки.

Тугая тампонада печени — использование 6–12 марлевых тампонов, которые оставляют в брюшной полости или выводят через контрапертуру в правом подреберье.

Пакетирование (обёртывание) печени — сдавление органа в передне-заднем направлении с помощью салфетки или плёнки при полной мобилизации связочного аппарата печени и сохранении оттока крови из вен печени.

Применение физических методов коагуляции — аргонплазменная, электрокоагуляция, прижатие тупфером или тампоном, пропитанным горячим изотоническим раствором натрия хлорида.

Использование химических гемостатических средств — аппликация гемостатических агентов (например, Surgicel, Tachocomb).

2. Приём Прингла не рекомендуется пережимать более чем на 20 минут. После окончательной остановки кровотечения постепенно ослабляя турникет на печёчно-двенадцатиперстной связке в течение 10–15 минут наблюдают за изменением окраски печени. Появление тёмно-багрового или серого цвета свидетельствует о нарушении кровоснабжения.

Тугая тампонада печени и пакетирование могут применяться до момента остановки кровотечения.

Важно учитывать, что выбор метода зависит от интенсивности кровотечения, локализации повреждения, окружающих условий и может комбинироваться с другими способами. После временной остановки кровотечения необходимо провести окончательные мероприятия для

достижения гемостаза.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 82

Условия

У больного Н., 44 лет, диагностирован острый деструктивный панкреатит с явлением перитонита.

Задания

Какие цели преследует оперативное вмешательство при этом заболевании?

Эталоны ответов

Целями являются:

- 1) прекращение активации протеолитических ферментов и дальнейшего разрушения железы созданием условий для оттока поджелудочного сока;
- 2) обеспечение условий для отхождения секвестрировавшихся участков железы и экссудата;
- 3) устранение воспаления в желчных путях.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 83

Условия

В стационаре у больного Н., 43 лет, выявлена портальная гипертензия.

Задания

Какое из внутрисосудистых исследований наиболее безопасно и информативно для установления уровня блокады портального кровотока и решения вопроса о методе хирургического лечения?

Эталоны ответов

«Золотым стандартом» диагностики портальной гипертензии считается прямое инвазивное измерение давления в воротной вене. Это исследование позволяет точно определить уровень блокады портального кровотока и является ключевым для выбора метода хирургического лечения. Метод даёт объективные, количественные данные о давлении в системе воротной вены. Повышение разницы показателей (ПВГД) более 10 мм рт. ст. подтверждает диагноз портальной гипертензии. Это критически важно для планирования операции, так как позволяет оценить степень гипертензии и риск осложнений.

Из-за рисков инвазивных методов в современной практике часто используют комбинированный подход. Сначала проводят неинвазивные исследования (УЗИ с доплером, КТ, МРТ), чтобы оценить анатомию и исключить противопоказания к дальнейшему, более детальному обследованию.

Если эти методы не дают полной картины, применяют трансумбиликальную портогепатографию - метод, позволяющий оценить состояние портальной гемодинамики и ангиоархитектоники на всём протяжении портальной системы и позволяющую контрастировать внутripеченочные вены 3-го порядка и мельче. Для спленопортографии производят чрескожную пункцию селезенки, при которой существует опасность разрыва этого органа и внутреннего кровотечения.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.3.10, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 84

Условия

Больному N., 38 лет, при осложненной язве двенадцатиперстной кишки выполнена селективная ваготомия в сочетании с дренирующей желудок операцией (по Финнею).

Задания

Объясните цели этих оперативных вмешательств.

Эталоны ответов

Селективная ваготомия (по Летарже) - пересечение ветвей блуждающих стволов, идущих к телу желудка - позволяет выключить первую сложнорефлекторную фазу желудочного пищеварения и, следовательно, уменьшить секрецию желудочного сока. Вследствие нарушения иннервации желудка происходит снижение его тонуса, возникает спазм привратника, что затрудняет эвакуацию содержимого в двенадцатиперстную кишку. Это диктует необходимость операции, способствующей опорожнению желудка, то есть дренирующей операции.

Дренирующая операция по Финнею создает гастродуоденальный анастомоз («бок в бок»).

Основные этапы:

1. Стенка двенадцатиперстной кишки подшивается узловыми серо-серозными швами к большой кривизне выходного отдела желудка на протяжении 5–6 см.
2. Просвет желудка и двенадцатиперстной кишки вскрывают подковообразным разрезом, который проходит через пилорический жом и как можно ближе к линии серо-серозных швов.
3. Вторым рядом кетгутового непрерывного шва формируют заднюю губу анастомоза.
4. Переднюю губу создают с помощью частых однорядных узловых швов.

Ширина формируемого гастродуоденального канала составляет 5–6 см. Если на передней стенке двенадцатиперстной кишки есть язва, её иссекают тем же подковообразным разрезом, который идёт параллельно основному и сходится с его концами.

К преимуществам можно отнести: возможность иссечения краев язвы и рубцовой ткани в пределах здоровых тканей и относительную техническую простоту.

К недостаткам:

1. Пилорический сфинктер полностью выключается из моторно-эвакуаторной деятельности желудка.
2. Широкое соустье может способствовать ускоренной эвакуации пищи из желудка.
3. Существует риск заброса содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок (дуоденогастральный рефлюкс).
4. В просвете анастомоза может формироваться «киль», который потенциально способен травмировать слизистую при прохождении пищи.

Модификации

Для снижения риска рефлюкса разработаны модификации операции Финнея. Например, по патенту SU1676597A1, по всему периметру анастомоза формируют антирефлюксный клапанный аппарат за счёт создания складок-дубликатур из стенок желудка и двенадцатиперстной кишки по задней окружности, а по передней — только из дубликатуры стенки двенадцатиперстной кишки.

Показания:

1. Язвенный пилородуоденальный стеноз.
2. Дуоденальные кровотечения.
3. Низкие залуковичные язвы.
4. Пенетрация язвенного дефекта в желчный проток и другие состояния.

Противопоказания:

1. Дуоденальная непроходимость.
2. Обширные язвенные инфильтраты, распространяющиеся на переднюю полуокружность двенадцатиперстной кишки.
3. Тяжёлые сопутствующие патологии в стадии декомпенсации (сердечная, дыхательная недостаточность, декомпенсированный сахарный диабет и др.).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.310, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 85

Условия

Одним из оперативных приемов на желудке является гастростомия - наружный свищ желудка.

Задания

Назовите его виды и их различия.

Эталоны ответов

Наружный свищ желудка; может быть временным, либо постоянным.

Различия этих видов оперативного приема представлены в таблице.

Характеристика наружного свища желудка (гастростомии).

Временный	Постоянный
Трубчатый	Губовидный
Канал для трубки образован серозной оболочкой	Канал для трубки образован слизистой оболочкой
При выскальзывании трубки её повторно можно ввести оперативным путём	Трубка вводится перед кормлением больного
	Для предупреждения вытекания пищи на протяжении канала формируют «замыкательный аппарат»
После удаления трубки свищ закрывается самостоятельно (эпителизируется)	Закрывают дополнительным оперативным вмешательством

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311.

Ситуационная задача № 86

Условия

Одним из этапов гастростомии, например по Витцелю в модификации по Гернезу и Хо-Дак-Ди, является гастропексия.

Задания

Объясните сущность и цель этого технического приема.

Эталоны ответов

Гастропексия - фиксация передней стенки желудка по периметру свища к париетальной брюшине и апоневрозу передней брюшной стенки. Между стенкой желудка и брюшной стенкой образуется спайка, исключая подтекание желудочного содержимого в брюшную полость между наружной поверхностью дренажной трубки и каналом для трубки, ограниченным серозной оболочкой стенки желудка. Кроме того, обеспечивается надежная фиксация стенки органа, исключая его отрыв при вздутии либо переполнении пищей.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311.

Ситуационная задача № 87

Условия

Больному N., 56 лет, ушивают прободную язву передней стенки желудка.

Задания

1. В каких случаях показан этот оперативный прием?
2. Объясните необходимость перитонизации линии шва лоскутом большого сальника «на ножке».
3. В какой ситуации показана резекция желудка?

Эталоны ответов

1. Прободную язву желудка ушивают:

- а) в случае её осложнения перитонитом (более 6 часов после перфорации);

б) у пациентов молодого возраста;

в) при тяжелом состоянии больного вследствие сопутствующих заболеваний (сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность). Язву ушивают в поперечном направлении 2-х рядным швом: 1-й ряд - 2-4 шва синтетической рассасывающейся нитью (дексон, полигликолид) через все слои стенки; 2-ой - серозномышечный синтетической нерассасывающейся нитью (капрон, лавсан). Поверх линии швов дексоновой нитью фиксируют сальник. Если края язвы очень плотны, их экономно иссекают для обеспечения лучшего заживления.

2. Перитонизацию линии шва осуществляют в целях профилактики его несостоятельности (наличие перифокального воспаления вокруг язвы, а при перитоните - воспаление серозной оболочки - обуславливают хрупкость стенки желудка). Тампонада прободного отверстия сальником на «ножке» по П. Н. Поликарпову состоит в следующем: кетгутовой нитью с двумя иглами на концах прошивают край сальника. Затем, каждой иглой прокалывают стенку желудка через перфоративное отверстие изнутри наружу. Выкол производят на расстоянии 2 см от края отверстия. При подтягивании лигатур лоскут сальника входит в отверстие, закрывая его наподобие пробки. Нити связывают в узел. Небольшой складкой сальника прикрывают сквозной шов и закрытое отверстие. Складку сальника фиксируют к «здоровому» участку стенки узловыми кетгутовыми швами.

3. При отсутствии признаков перитонита (менее 6 часов после перфорации) выполняется резекция желудка.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 88

Условия

Больному N., 42 лет, с целью удаления инородного тела тонкой кишки произведена энтеротомия (разрез кишки в продольном направлении длиной 2,5 см). После извлечения инородного тела хирург приступил к ушиванию раны.

Задания

В каком направлении должна быть ушита рана кишки? Какие швы будет использовать хирург?

Эталоны ответов

Рану кишки (во избежание стеноза) ушивают в поперечном направлении классическим двухрядным швом: первый ряд - вворачивающий шов Шмидена (скорняжный) рассасывающимся материалом (полисорб, викрил, дексои, максон, PDS, кетгут); второй ряд - узловой серозно-мышечный шов Ламбера нерассасывающимся материалом (полипропилен, монофиламентный полиамид, шелк).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311.

Ситуационная задача № 89

Условия

После «классической» аппендэктомии у больного обнаружен подвздошный отросток (дивертикул Меккеля).

Задания

Что должен сделать хирург в подобной ситуации?

Эталоны ответов

Подвздошный отросток (дивертикул Меккеля) необходимо удалить. Его иссекают у основания под углом в 45° (в косопоперечном направлении) с последующим ушиванием поперечной кишечной раны двухрядным швом. При дивертикулите с вовлечением стенки подвздошной кишки производят клиновидную резекцию этого органа с последующим ушиванием раны.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 90

Условия

В хирургическое отделение поступил Н., 32 лет, с проникающей колото-резаной раной живота по срединной линии, на 4 см книзу от пупка. С целью осмотра брюшной полости выполнена средне-срединная лапаротомия. В брюшной полости обнаружено небольшое количество крови, а между петлями тонкой кишки - содержимое.

Задания

1. Объясните последовательность ревизии брюшной полости.
2. Какими ориентирами брюшной полости будет пользоваться хирург при ревизии?

Эталоны ответов

1. При наличии тонкокишечного содержимого в брюшной полости ревизию начинают с тонкой кишки, затем осматривают все органы брюшной полости, прилежащие органы забрюшинного пространства и малого таза.
2. Ориентиры при осмотре органов нижнего отдела (этажа) брюшной полости:
 - 1) латеральные каналы;
 - 2) корни брыжеек кишок: тонкой, поперечной ободочной, сигмовидной ободочной;
 - 3) фиксированные отделы тонкой кишки (двенадцатиперстноточий изгиб - ориентир начальной части тощей кишки, илеоцекальный угол - ориентир терминальной части подвздошной кишки;
 - 4) фиксированные отделы ободочной кишки (правый, или печеночный; левый, или селезеночный изгибы).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311.

Ситуационная задача № 91

Условия

У больного Н., 35 лет, как осложнение деструктивного аппендицита в правой брыжеечной пазухе скопился экссудат.

Задания

1. Назовите стенки этой пазухи.
2. Может ли распространиться экссудат из этой пазухи в левую и полость малого таза?

Эталоны ответов

1. Стенками правой брыжеечной пазухи являются: латерально - восходящая ободочная кишка, медиально и снизу - брыжейка тонкой кишки, сверху - брыжейка поперечной ободочной кишки, сзади - париетальная брюшина, спереди - большой сальник.
2. Да, между корнем брыжейки поперечной ободочной кишки и начальной частью тощей кишки.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 92

Условия

В хирургическое отделение поступила больная Н., 35 лет, с картиной острой кишечной непроходимости. В анамнезе длительное голодание с целью похудения. Накануне больная приняла обильное количество грубой пищи.

Задания

1. Какой вид кишечной непроходимости следует заподозрить у неё?
2. Каким образом можно попытаться ликвидировать эту непроходимость без хирургического вмешательства?

Эталоны ответов

1. Артериомезентериальная (высокая тонкокишечная) непроходимость в результате нарушения эвакуации содержимого из двенадцатиперстной кишки в тощую (атония 12-перстной кишки, как результат голодания; сдавление 12-перстной кишки стволом верхней брыжеечной артерии - спереди и брюшной частью аорты - сзади).
2. Оперативное вмешательство показано при прогрессирующих формах синдрома с нарушением проходимости двенадцатиперстной кишки, развитии холангита, перфорации или некроза её стенки (Операция Стронга, дуоденоюностомия, инфраренальная транспозиция верхней брыжеечной артерии, установка нитиновых стентов).

Консервативное лечение направлено на уменьшение степени дуоденальной непроходимости и коррекцию сопутствующих нарушений. Основные компоненты: лечебное питание (рекомендуется диета с приёмом жидкой, полужидкой и протёртой пищи малыми порциями); медикаментозная терапия (применяются прокинетики для стимуляции моторики ЖКТ, спазмолитики для снятия спазма, ферментные препараты и антибактериальные средства.; коррекция лабораторных отклонений (проводится инфузионная терапия для восстановления водно-электролитного баланса, назначаются препараты для нормализации работы ЖКТ)

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 94

Условия

У больной Н., 43 лет, после холецистэктомии развилась острая печеночная недостаточность вследствие некроза правой доли печени.

Задания

1. Какая ошибка, допущенная при холецистэктомии, привела к такому грозному осложнению?
2. Каким образом можно избежать этого осложнения?

Эталоны ответов

1. При холецистэктомии вследствие чрезмерного подтягивания желчного пузыря в рану была перевязана правая печеночная артерия.
2. При выделении и перевязке желчнопузырной артерии следует ориентироваться на шейку желчного пузыря, угол между общим печеночным и пузырным протоками и треугольник Кало. Кроме того, ассистенты обеспечивают натяжение печеночно-дуоденальной связки.

2.310, 2.у12, 2.у12

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.у12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.у10, 2.у12.

Ситуационная задача № 95

Условия

Больному Н., 23 лет, по поводу выполняют грыжесечение правосторонней латеральной

косой паховой грыжи по способу С.И. Спасокукоцкого-М.А. Кимбаровского.

Задания

Опишите этапы пластики пахового канала.

Эталоны ответов

Кпереди от семенного канатика отдельными узловыми швами к паховой связке (отступив 5 мм от её заднего края) подшивают верхний лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота вместе с нижними краями внутренней косой и поперечной мышц, при выколе изнутри повторно захватывают край верхнего лоскута апоневроза и только после этого прошивают паховую связку (для обеспечения соединения однородных тканей: апоневроза и паховой связки). Путем введения кончика ногтевой фаланги мизинца во вновь сформированное отверстие убеждаются как свободно располагается семенной канатик. Нижний лоскут апоневроза укладывают на верхний и фиксируют вторым рядом швов.

Проверяют - не ущемлен ли семенной канатик. Рану ушивают.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 96

Условия

Больному К., 42 лет, при рубцовом стенозе пищевода решено выполнить пластику тонкой кишкой.

Задания

Назовите способы проведения участка тонкой кишки на шею.

Эталоны ответов

1. Подкожное проведение по туннелю.

Этот метод предполагает формирование подкожного тоннеля на передней поверхности грудной клетки (часто предгрудинного) от брюшной полости до шеи. Трансплантат проводят по этому туннелю. После выведения на шею формируют анастомоз (соединение) между кишечным трансплантатом и шейным отделом пищевода.

2. Внутривисцеральный путь.

В некоторых случаях трансплантат проводят через окно в брыжейке поперечной ободочной кишки и желудочно-толстокишечной связке, чтобы избежать перегибов кишки.

3. Свободная пересадка с микрососудистыми анастомозами.

После мобилизации сегмента тонкой кишки его переносят на шею и формируют микрососудистые анастомозы (соединения) между сосудами трансплантата и сосудами шеи.

а) Артериальный анастомоз. Обычно первым формируют соединение с артерией подходящего диаметра, например, с верхней щитовидной, поперечной шейной или наружной сонной артерией.

б) Венозный анастомоз. Затем создают соединение с веной, чаще всего с внутренней яремной веной.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 97

Условия

У больного Н., 40 лет, гидроперикард.

Задания

В какой пазухе перикарда при положении больного на спине скапливается патологическая жидкость? Чем ограничена эта пазуха спереди, сзади, снизу и справа, слева и сверху?

Эталоны ответов

В косой пазухе перикарда, спереди она ограничена задней стенкой левого предсердия,

покрытая эпикардом, сзади - задней стенкой перикарда, снизу и справа - нижней поллой веной и устьевыми отделами правых легочных вен, сверху и слева - устьевыми отделами левых легочных вен также покрытые эпикардом.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 98

Условия

У больной N., 44 лет, при маммографии обнаружен рак молочной железы.

Задания

Какие дополнительные обследования необходимы для решения вопроса о возможности радикальной операции?

Эталоны ответов

Для решения вопроса о возможности радикальной операции при раке молочной железы необходимо получить информацию о состоянии: подмышечных, загрудинных и шейных лимфоузлов на стороне поражения, молочной железы и лимфоузлов на противоположной стороне (контрлатеральное метастазирование), органов грудной полости (средостение), органов брюшной полости, в частности, лимфоузлов ворот печени, шейного и грудного отделов позвоночника, яичников.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 99

Условия

У N., 36 лет, рана мягких тканей лобной области.

Задания

1. Что следует учитывать при иссечении краев раны?
2. Какой разрез используют при иссечении стенок раны?
3. Как иссекают слои, составляющие стенки раны?

Эталоны ответов

1. Форму и локализацию раны, направление волокон лобной и круговой мышцы глаза, надглазничного и надблокового сосудисто-нервных пучков, возможность сближения краев раны без натяжения, а также косметические результаты операции.

2. Окаймляющими в вертикальном направлении разрезами (поперечно к кожным складкам или морщинам), отступая от края раны 0,5-1 см (до появления кровотечения).

3. Кожу, подкожную клетчатку и апоневротический шлем иссекают за один прием. При значительной отслойке кожно-апоневротических лоскутов, наличии "карманов" и подозрении на развитие воспалительного процесса, наносят контрапертуры, рану дренируют на 1-2 суток.

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311, 1.y12, 2.33, 2.36, 2.310, 2.y10, 2.y12.

Ситуационная задача № 100

Условия

Околоушно-жевательная фасция образует капсулу и ложе околоушной железы.

Задания

1. Что понимают под «ложем» железы?
2. В каких отделах капсула более плотная и толстая, в каких развита слабо?
3. Чем отличаются взаимоотношения околоушной и поднижнечелюстной желез с их

капсулами?

Эталоны ответов

1. Ложе околоушной железы образуют жевательная, медиальная крыловидная, двубрюшная (заднее брюшко), грудино-ключично-сосцевидная мышца, мышцы “анатомического букета” (начинающиеся от шиловидного отростка), ветвь нижней челюсти и ее фасциальная капсула.
2. В верхнезаднем (у наружного слухового прохода) и медиальном (глочный отросток) отделах она развита слабо.
3. Околоушная железа прочно связана с капсулой (в толщу железы проникают фасциальные перегородки), поднижнечелюстная - рыхло (между капсулой и железой находится клетчатка).

Коды результатов обучения: 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.311.

АННОТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ТЕМЕ
«Избранные вопросы хирургии»

Специальность	Терапия.	
Тема	«Избранные вопросы хирургии»	
Цель	совершенствование компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности по специальности «Хирургия» (область профессиональной деятельности – 02 Здравоохранение, уровень квалификации – 8 уровень)	
Задачи программы	- обновление существующих теоретических знаний, методик и изучение передового практического опыта по вопросам диагностической, лечебной, реабилитационной и профилактической деятельности в области хирургии. - обновление и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по вопросам диагностической, лечебной, профилактической, психолого-педагогической и организационно-управленческой деятельности, необходимых для выполнения профессиональных задач в рамках имеющейся квалификации врача-хирурга.	
Категория обучающихся	Уровень профессионального образования – высшее образование по специальности: лечебное дело. Профиль – врачи-хирурги, имеющие сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Хирургия»	
Трудоемкость	144 акад.час.	
Форма обучения	очная	
Режим занятий	6 акад.час. в день	
Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию в результате освоения программы	ПК-1	Способен при оказании медицинской помощи по профилю «хирургия» проводить медицинское обследование пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями с целью установления диагноза
	ПК-2	Способен при оказании медицинской помощи по профилю «хирургия» назначать и проводить лечение пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, контролировать его эффективность и безопасность
	ПК-3	Способен при оказании медицинской помощи по профилю «хирургия» оформлять направление на медицинскую реабилитацию пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями
	ПК-4	Способен проводить медицинские экспертизы, медицинские осмотры, диспансеризацию, медицинское освидетельствование в отношении пациентов с хирургическими заболеваниями и (или)

		состояниями и их последствиями
	ПК-5	Способен при оказании медицинской помощи по профилю «хирургия» проводить мероприятия по профилактике хирургических заболеваний и (или) состояний и их последствий у населения
	ПК-6	Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию, организовывать деятельность находящегося в распоряжении младшего и среднего медицинского персонала
	ПК-7	Способен оказывать медицинскую помощь в экстренной форме
Характеристика новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы		нет
Разделы (модули) программы	Модуль 1. Актуальные вопросы медицинского обследования пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и диагностики хирургических заболеваний и (или) состояний	
	Модуль 2. Актуальные вопросы хирургического лечения и медицинской реабилитации	
	Модуль 3. Актуальные вопросы организации работы врача-хирурга. Медицинская экспертиза в хирургии	
	Модуль 4. Современные технологии оказания медицинской помощи в экстренной форме	
	Модуль 5. Практика	
Обучающий симуляционный курс	да	Автоматическая наружная дефибрилляция. Безопасная работа с дефибриллятором. Поворот в восстановительное боковое положение, прием Геймлиха, постановка назо- и орофарингеального воздуховода, надгортанных воздуховодов. Остановка наружного кровотечения путем наложения давящей повязки
Применение дистанционных образовательных технологий	нет	-
Стажировка	нет	-
Формы аттестации	да	Промежуточная аттестация, итоговая аттестация